



## CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y BIOQUÍMICA DE CEPAS DE *Rhizobium* COLECTADAS EN FRIJOL COMÚN SILVESTRE Y DOMESTICADO

### MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF *Rhizobium* STRAINS COLLECTED FROM WILD AND DOMESTICATED COMMON BEAN

José de J. López-Alcocer<sup>1</sup>, Rogelio Lépiz-Ildefonso<sup>2\*</sup>, Diego R. González-Eguiarte<sup>2</sup>, Ramón Rodríguez-Macias<sup>2</sup>, Eduardo López-Alcocer<sup>2</sup> y Víctor Olalde-Portugal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Doctorado en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, <sup>2</sup>Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100. Las Agujas, Zapopan, Jalisco. <sup>3</sup>Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Km 9.6 Carr. Irapuato León. 36821, Irapuato, Guanajuato.

\*Autor para correspondencia (rlépiz@cucbas.udg.mx)

#### RESUMEN

La asociación *Rhizobium*-leguminosa es considerada un proceso de alta eficiencia en fijación biológica del nitrógeno atmosférico (FBN) y puede ser capaz de abastecer hasta 90 % de las necesidades de nitrógeno en dichas plantas. El objetivo de esta investigación fue realizar la descripción morfológica y bioquímica de 20 cepas de *Rhizobium*, nueve procedentes de raíces de frijol (*Phaseolus vulgaris* L.) común silvestre y 11 de raíces de frijol domesticado de la región occidental de México. En la caracterización morfológica de las colonias, todas las cepas exhibieron crecimiento rápido (2 a 3 d) y presentaron color blanco y borde liso, 14 mostraron forma convexa y 12 aspecto traslúcido. En la caracterización bioquímica, todos los rizobios se desarrollaron en medios con valores de pH iguales o mayores de 6.0 y cuatro no crecieron en pH de 4.0 a 5.5. En tolerancia a cloruro de sodio, todas las cepas crecieron a 1 % de concentración, 13 lo hicieron a 3 % y ninguna entre 5 y 10 %. En resistencia a metales pesados todos los rizobios fueron susceptibles a cloruro de mercurio y sulfato de cobre, ocho fueron resistentes a sulfato de magnesio y sólo dos a sulfatos de magnesio y zinc. En resistencia a antibióticos, 16 exhibieron resistencia a los 12 productos utilizados. Las 20 cepas estudiadas mostraron variabilidad y en general presentaron crecimiento rápido, tolerancia a valores de pH ácido, tolerancia a concentraciones moderadas de cloruro de sodio, susceptibilidad a metales pesados, resistencia a antibióticos y corresponden a bacterias del género *Rhizobium*. No se observaron diferencias entre las cepas provenientes de frijol silvestre y las provenientes de la forma domesticada.

**Palabras clave:** *Phaseolus vulgaris*, *Rhizobium*, caracterización morfológica, caracterización bioquímica.

#### SUMMARY

The *Rhizobium*-legume association is considered a highly efficient process in biological nitrogen fixation (BNF) and may supply up to 90 % of the nitrogen requirements for those plants. This research described the morphological and biochemical characteristics of 20 *Rhizobium* strains, nine from wild common bean roots and 11 from domesticated bean roots from Western Mexico. Morphological characterization of colonies showed that all strains exhibited rapid growth (2 to 3 d), white color and smooth border; 14 had a convex shape, and 12 were translucent. Results from the biochemical characterization indicated that all rhizobia developed at pH values equal to or greater than 6.0, and four did not grow in pH from 4.0 to 5.5. Strains responded differently to concentrations of sodium chloride: all strains grew at 1 %, 13 grew at 3 % and none grew at 5 to 10 %. Resistance to heavy metals showed that all

rhizobia were susceptible to mercury chloride and copper sulfate, eight were resistant to magnesium sulfate and only two to magnesium sulfate and zinc sulfate. Sixteen strains exhibited resistance to the 12 antibiotic products used. The 20 strains in this study showed variability and generally presented rapid growth, tolerance to acid pH values, tolerance to moderate concentrations of sodium chloride, susceptibility to heavy metals, resistance to antibiotics and correspond to bacteria of the genus *Rhizobium*. No differences were observed between strains from wild beans and those from domesticated ones.

**Key words:** *Phaseolus vulgaris*, *Rhizobium*, morphological characterization, biochemical characterization.

#### INTRODUCCIÓN

Las bacterias del género *Rhizobium* tienen la capacidad de inducir en las raíces de las leguminosas la formación de estructuras especializadas llamadas nódulos, dentro de las cuales el N<sub>2</sub> atmosférico, que es muy estable y relativamente inerte, se reduce a iones amonio (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) fácilmente asimilables por la mayoría de las especies vegetales (Marquina *et al.*, 2011).

La asociación *Rhizobium*-leguminosa se considera un proceso de alta eficiencia en fijación biológica del nitrógeno atmosférico (FBN); se estima que la fijación de nitrógeno varía de 24 hasta 584 kg ha<sup>-1</sup> y tiene la capacidad de abastecer hasta 90 % de las necesidades de la planta (Ángeles-Núñez y Cruz-Acosta, 2015); además, la FBN contribuye a reducir el uso de fertilizantes nitrogenados, a remediar los problemas de contaminación del suelo y agua, y a disminuir los costos de producción, lo cual representa una ventaja económica, a la par de una buena práctica ambiental en la producción agrícola (Granda *et al.*, 2014; Yadegari y Rahmani, 2010).

Las especies del género *Rhizobium* son bacilos móviles Gram-negativos con pared celular, flagelados (1 a 6 flagelos), aerobios que miden 0.5-0.9 × 1.2-3.0 µm, y pueden ser peritricales o subpolares. Las colonias generalmente

son blancas o color beige, circulares, convexas, semitranslúcidas u opacas y mucilaginosas, que miden de 2 a 4 mm de diámetro de los 3 a los 5 d de incubación en extracto de levadura manitol agar rojo congo (ELMARC) (Abd-Alla *et al.*, 2012).

El estudio de la taxonomía de los rizobios se basa en varios aspectos como caracterización morfológica, bioquímica y fisiológica, entre otros, y no se pueden adelantar otros como eficiencia en la fijación de N, si no se ha demostrado que pertenecen al género *Rhizobium* e identificado sus características fenotípicas (Granda *et al.*, 2014; Villanueva y Quintana, 2012).

Los estudios de caracterización morfológica, bioquímica o molecular en el género *Rhizobium* se han utilizado con diferentes y múltiples propósitos. Destacan los trabajos para evaluar su efectividad potencial (capacidad de fijar N<sub>2</sub>) y capacidad infectiva (inducción de nodulación) (Ángeles-Núñez y Cruz-Acosta, 2015; Mendoza y Bonilla, 2014); diversidad genética (Aserse *et al.*, 2012; Granda *et al.*, 2009); resistencia a metales (Abd-Alla *et al.*, 2012); taxonomía (Gauri *et al.*, 2011; Wei *et al.*, 2003); y para uso como bioinóculo (Cuadrado *et al.*, 2009; Pérez *et al.*, 2008).

Los estudios de caracterización morfológica de cepas de *Rhizobium* aisladas de nódulos de frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.) han incluido las variables de velocidad de crecimiento, color, apariencia, tipo de borde y elevación de las colonias. Sosa *et al.* (2004) señalan que las colonias de *Rhizobium* se observan blancas o ligeramente rosadas, forman colonias circulares, son de forma convexa, semitranslúcidas y de crecimiento rápido. Sostienen que las bacterias del género *Bradyrhizobium* forman colonias circulares, secas, raramente translúcidas, blancas, convexas, con tendencia a ser granuladas y de crecimiento lento, de 5 a 7 d. En Ecuador, Granda *et al.* (2013) investigaron la identidad de 45 aislados, 24 de los cuales presentaron características morfológicas pertenecientes al género *Rhizobium*, crecimiento rápido (2 a 3 d), coloración blanca o rosada, bordes lisos y ondulados y figura elevada y plana.

Por su parte Villanueva y Quintana (2012) estudiaron variables morfológicas en 10 aislados de rizobios nativos de Perú; señalan que seis de las muestras presentaron características referentes al género *Rhizobium*: consistencia gelatinosa, color blanquecino y velocidad de crecimiento entre 3 y 5 d. Keneni *et al.* (2010) hicieron una caracterización morfológica y bioquímica de cinco aislados nativos de *Rhizobium* procedentes de frijol común del norte de Etiopía y dos cepas de alta eficiencia en fijación. Los aislados nativos fueron tolerantes a concentraciones de 5 % de sal, mostraron mayor resistencia a antibióticos y mayor eficiencia en fijación biológica de nitrógeno. Los autores

indicaron que los aislados no presentaron crecimiento a niveles de pH menores de 4.

Se han efectuado caracterizaciones morfológicas y bioquímicas de aislados de *Rhizobium* procedentes de otras especies de leguminosas. El estudio realizado por Carpio *et al.* (2014 Com. Pers.)<sup>1</sup> con aislados de rizobios procedentes de cinco especies de leguminosas: chícharo (*Pisum sativum* L.), lupinos (*Lupinus* spp.), frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.), haba (*Vicia faba*) y *Vicia* sp., encontraron que las bacterias asociadas a frijol, chícharo, haba y *Vicia* sp. presentaron características correspondientes al género *Rhizobium*, mientras que los rizobios aislados en lupinos mostraron rasgos del género *Bradyrhizobium*. Por otra parte, Berrada *et al.* (2012) realizaron estudios de caracterización de 110 cepas de *Rhizobium* procedentes de leguminosas de grano y forrajeras. Encontraron que 81 de los aislados estudiados fueron de crecimiento rápido, 44 presentaron tolerancia a concentración de 2 % de NaCl e indicaron que la mayoría presentaron tolerancia a pH de 4 a 8.8, resistencia a antibióticos y a metales pesados (zinc, cobre, níquel y mercurio).

Con base en la diversidad genética de *Phaseolus vulgaris* silvestre en la región occidente de México (Lépiz-Ildefonso y Ramírez-Delgado, 2010) y la presencia de bacterias de *Rhizobium* asociadas a diferentes formas de frijol común, el objetivo del presente estudio fue la caracterización morfológica y bioquímica de una colecta de 20 cepas de *Rhizobium* aisladas de nódulos de raíces de plantas de frijol silvestre y domesticado.

## MATERIALES Y MÉTODOS

### Colecta de nódulos y purificación de las cepas de *Rhizobium*

La colecta de nódulos se realizó en seis localidades de los estados de Jalisco y Michoacán en los meses de septiembre y octubre de 2012 (Cuadro 1). Se extrajeron raíces de cuatro plantas en etapa de floración por sitio de colecta, a una profundidad de 20 cm; las raíces de cada planta se colocaron en una bolsa de plástico, la muestra se identificó y se registraron los datos de tipo de suelo, ubicación geográfica y tipo de vegetación. En el laboratorio se lavaron con agua; de cada raíz se seleccionaron de cinco a seis nódulos grandes, color rosado, superficie rugosa y con estrías claras y blancas; se lavaron en solución jabonosa y

<sup>1</sup>Carpio M. J., B. M. Paucar y S. P. Alvarado O. (2013) Caracterización morfológica de rizobios asociados a cultivos de arveja (*Pisum sativum* L.), chocho (*Lupinus mutabilis* S.), fréjol (*Phaseolus vulgaris* L.), haba (*Vicia faba* L.), y vicia (*Vicia atropurpurea*) en suelos del Ecuador. In: Memorias de la II Conferencia Iberoamericana de Interacciones Beneficiosas Microorganismo-Planta-Ambiente. Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno. Sevilla, España. pp:1-2.

se desinfectaron con alcohol etílico al 70 % por 1 min; se enjuagaron con agua destilada estéril, se les transfirió a una solución de hipoclorito de sodio al 2 % durante 3 min y finalmente se lavaron cinco veces con agua destilada estéril para retirar el exceso de cloro (Rodríguez, 1993; Somasegaran y Hoben, 1994).

Los nódulos lavados y desinfectados de cada una de las raíces, se depositaron en un tubo de ensayo con 5 mL de agua destilada y se maceraron con una varilla de vidrio. De cada tubo se tomó una muestra de la suspensión y se sembró en estrías en cajas de Petri en medio extracto de levadura manitol agar rojo congo (ELMARC). Las cajas se incubaron a 28 °C por un periodo de 5 d, para el crecimiento de las colonias de bacterias (Ángeles-Núñez y Cruz-Acosta, 2015; Vincent, 1970).

Para la purificación de los aislados, de cada caja se seleccionaron aquellas colonias blancas o ligeramente rosadas, con poca o nula absorción de rojo congo, característica de las bacterias de *Rhizobium* (Pérez *et al.*, 2008). Las colonias seleccionadas se sembraron cinco veces en cajas de Petri siguiendo el mismo procedimiento. Para su

mantenimiento y conservación, los aislados se sembraron en medio extracto de levadura manitol agar (ELMA) en tubos de ensayo a 4 °C (Rodríguez, 1993).

## Caracterización de los aislados

### Caracterización morfológica

Se incluyeron seis variables a nivel de colonia: velocidad de crecimiento (d), forma (convexa, cupular), color (blanco, rosado), aspecto (traslúcido, opaco), borde (liso, rugoso) y textura (gomosa, acuosa) (Cuadro 1). Para la caracterización se siguió la metodología descrita por el CIAT (1988). Los aislados se sembraron en cajas de Petri con medio ELMA, en dos cajas por aislado. Las cajas se incubaron a 28 °C por un periodo de 5 d hasta observar crecimiento de las bacterias y entonces se procedió a evaluar el comportamiento de las colonias.

### Caracterización bioquímica

Se realizaron cuatro pruebas: tolerancia a pH, tolerancia a cloruro de sodio (NaCl), resistencia a metales pesados y

**Cuadro 1. Caracterización morfológica de 20 cepas de *Rhizobium* colectadas en plantas de frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.) silvestre y domesticado en los estados de Jalisco y Michoacán, México.**

Código de aislado	Sitio de origen	Forma de frijol	Velocidad crecimiento (d)	Características				
				Forma	Color	Aspecto	Borde	Textura
Rhizojal VC1	Nevado de Colima	S	2	Convexa	Blanco	Traslúcida	Liso	Gomosa
Rhizojal VC2	Nevado de Colima	S	2	Convexa	Blanco	Traslúcida	Liso	Gomosa
Rhizojal VC3	Nevado de Colima	S	2	Convexa	Blanco	Traslúcida	Liso	Gomosa
Rhizojal BH1	Huentitán	S	2	Convexa	Blanco	Traslúcida	Liso	Gomosa
Rhizojal BH2	Huentitán	S	2	Convexa	Blanco	Traslúcida	Liso	Gomosa
Rhizojal BH3	Huentitán	S	2	Convexa	Blanco	Traslúcida	Liso	Gomosa
Rhizojal SA1	San Andrés	S	3	Cupular	Blanco	Traslúcida	Liso	Acuosa
Rhizojal SA2	San Andrés	S	3	Cupular	Blanco	Traslúcida	Liso	Acuosa
Rhizojal SA3	San Andrés	S	3	Cupular	Blanco	Traslúcida	Liso	Acuosa
Rhizojal ZMA1	Zapopan	D	3	Convexa	Blanco	Opaca	Liso	Gomosa
Rhizojal ZMA2	Zapopan	D	3	Convexa	Blanco	Opaca	Liso	Gomosa
Rhizojal ZGZ2	Zapopan	D	3	Convexa	Blanco	Opaca	Liso	Gomosa
Rhizojal ZGZ3	Zapopan	D	3	Convexa	Blanco	Opaca	Liso	Gomosa
Rhizojal ZCB3	Zapopan	D	2	Cupular	Blanco	Traslúcida	Liso	Acuosa
Rhizojal ZAT1	Zapopan	D	2	Cupular	Blanco	Traslúcida	Liso	Acuosa
Rhizojal ZAT2	Zapopan	D	2	Cupular	Blanco	Traslúcida	Liso	Acuosa
Rhizojal TP1	Tizapán	D	3	Convexa	Blanco	Opaca	Liso	Gomosa
Rhizojal TP3	Tizapán	D	3	Convexa	Blanco	Opaca	Liso	Gomosa
Rhizomich CR1	Cojumatlán	D	2	Convexa	Blanco	Opaca	Liso	Gomosa
Rhizomich CR2	Cojumatlán	D	2	Convexa	Blanco	Opaca	Liso	Gomosa

Todos los sitios pertenecen al estado de Jalisco, excepto Cojumatlán, Michoacán. S: frijol silvestre; D: frijol domesticado.

resistencia a antibióticos (Cuadros 2, 3 y 4). En todos los casos y antes de cada prueba, los aislados se cultivaron en tubos de ensayo que contenían medio líquido extracto de levadura manitol (CELM) (Rodríguez, 1993), se colocaron en agitación a 200 rpm hasta alcanzar un crecimiento mínimo de  $10^6$  UFC mL<sup>-1</sup>, concentración medida por comparación con la escala de McFarland (1907). En todos los casos se utilizó 1.0 mL de la suspensión, dilución que se distribuyó uniformemente con una varilla de vidrio en las cajas de Petri con medio ELMA. Igualmente, después de la inoculación de las bacterias en las cajas con el tratamiento respectivo, se incubaron a 28 °C por 5 d antes de registrar el resultado de la evaluación correspondiente. Se utilizaron tres cajas de Petri por tratamiento. La respuesta de los aislados de *Rhizobium* a las cuatro pruebas bioquímicas, se registró como positiva (+) cuando hubo crecimiento y negativa (-) cuando no lo hubo.

Para la evaluación por tolerancia a pH, se incluyeron nueve valores del factor: 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 y 8.5. Los aislados se sembraron en cajas de Petri en medio ELMA, con el pH ajustado a los diferentes valores, con hidróxido de sodio (NaOH) y ácido clorhídrico (HCl) 1N. La tolerancia a cloruro de sodio (NaCl) se evaluó a concentraciones de 1, 2, 3, 5 y 10 %.

La prueba de resistencia a metales incluyó cuatro compuestos: sulfato de zinc ( $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ ), sulfato de magnesio ( $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ), cloruro de mercurio ( $HgCl_2$ ) y sulfato de cobre ( $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ) en tres concentraciones cada uno: 10, 50 y 100 ( $\mu g$  mL<sup>-1</sup>). Una vez realizada la siembra de los aislados en cajas de Petri con medio ELMA, se colocaron los discos de papel filtro humedecido con las diferentes concentraciones de los metales. Los aislados se consideraron resistentes cuando ocurrió crecimiento (+) y sensibles cuando no lo hubo (-).

La evaluación por resistencia a antibióticos incluyó 12 productos contenidos en sensidiscos Gram negativo II (BIO-RAD, modelo 71080580, México), cuyas concentraciones en  $\mu g$  fueron: trimetoprim-sulfametoxazol (25  $\mu g$ ), amikacina (30  $\mu g$ ), ampicilina (10  $\mu g$ ), levofloxacina (5  $\mu g$ ), cefalotina (30  $\mu g$ ), cefotaxima (30  $\mu g$ ), ceftriaxona (30  $\mu g$ ), cloranfenicol (30  $\mu g$ ), gentamicina (10  $\mu g$ ), netilmicina (30  $\mu g$ ), cepefime (30  $\mu g$ ) y nitrofurantoína (30  $\mu g$ ). Como en las anteriores evaluaciones, las cajas de Petri se incubaron por 5 d antes de proceder a la evaluación.

### Análisis estadístico

La inspección y análisis de los datos de la caracterización morfológica, donde cada rasgo presenta dos opciones posibles en cada factor, se hizo directamente en la matriz de resultados. Con los datos de la caracterización

bioquímica obtenidos en los 38 tratamientos producto de las combinaciones de cuatro factores (tolerancia a pH, tolerancia a NaCl, resistencia a metales pesados y resistencia a antibióticos) y los niveles probados, se realizó un análisis de agrupamiento de los 20 aislados mediante el coeficiente de correlación. Para el análisis, la respuesta positiva (+) que significa crecimiento del aislado, se calificó como 1, y la respuesta negativa (-) que significa ausencia de crecimiento, como 0.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### Caracterización morfológica

Los resultados de la caracterización morfológica a nivel de colonia se muestran en el Cuadro 1. Las cepas mostraron diferencias en velocidad de crecimiento, forma, aspecto y textura, no así en color (todas blancas) ni borde (todas lisas). En velocidad de crecimiento, todas las cepas mostraron crecimiento rápido, entre 2 y 3 d. Once de ellas completaron su desarrollo en 2 d, incluidas seis provenientes de frijoles silvestres. En cuanto a la forma de las colonias, 14 cepas mostraron forma convexa y seis forma cupular. En aspecto, 12 cepas presentaron apariencia traslúcida y ocho opaca; fue notable que todos los aislados de la forma silvestre de frijol, mostraran aspecto traslúcido. En textura de colonias, 14 de los 20 aislados presentaron textura gomosa. Seis de las nueve cepas de la forma silvestre mostraron esta textura.

Los resultados de caracterización morfológica son similares a los reportados en la literatura (Granda *et al.*, 2013; Keneni *et al.*, 2010; Villanueva y Quintana, 2012) donde se consigna que las colonias de aislados de *Rhizobium* son de crecimiento rápido (2 a 3 d), blancas o ligeramente rosadas, forman colonias circulares, convexas y de aspecto traslúcido.

En vista de que todos los aislados presentaron color blanco y borde liso, que mostraron crecimiento rápido (1 a 3 d), aspecto traslúcido (60 %) y textura gomosa (70 %), además de tener en cuenta lo asentado en la literatura, se puede afirmar que los 20 aislados pertenecen a bacterias del género *Rhizobium*, y que las cepas procedentes del frijol silvestre y del domesticado son similares.

### Caracterización bioquímica

#### Tolerancia a pH

Con excepción de cuatro cepas que no crecieron en pH de 4.5 a 5.5, 16 mostraron crecimiento en todos los niveles evaluados (Cuadro 2). Estos resultados muestran que las cepas estudiadas presentan tolerancia a pH ácido

con valores hasta de 4.5. Resultados similares reportaron Cuadrado *et al.* (2009) y Marquina *et al.* (2011) al evaluar aislados de *Rhizobium* procedentes de frijol común; afirman que los aislados de crecimiento rápido pueden desarrollarse a partir de pH de 4.0.

**Tolerancia a cloruro de sodio**

Todas las cepas crecieron a 1 % de concentración, 15 de las 20 a 2 %, 13 a 3 % y solo Rhizojal VC2 a 5 % de concentración (Cuadro 2). Los resultados son similares a lo reportado en la literatura, donde se señala que el crecimiento bacteriano decrece al aumentar la cantidad de sal en el medio (Berrada *et al.*, 2012; Cuadrado *et al.*, 2009; Patil *et al.*, 2014).

**Resistencia a metales pesados**

Todas las cepas fueron suseptibles a las concentraciones evaluadas de cloruro de mercurio y sulfato de cobre (Cuadro 3). De las 20 cepas, trece (siete de variedades domesticadas y seis de frijol silvestre) mostraron resistencia a sulfato de magnesio y dos de éstas (Rhizojal VC2 de frijol silvestre y Rhizojal ZGZ3 de frijol domesticado) a sulfato de zinc. Abd-Alla *et al.* (2012) consignaron resultados similares en los que hicieron referencia a tolerancia a

Zn y susceptibilidad a Hg. En cambio, Berrada *et al.* (2012) reportaron que 110 aislados de diferentes leguminosas presentaron alta resistencia a diferentes concentraciones de Zn (10, 20, 40), Cu (10, 50, 100) y Hg (20, 25, 100) µg mL<sup>-1</sup>. En la presente investigación, ningún aislado exhibió resistencia a cloruro de mercurio, ni a sulfato de cobre. Las diferencias podrían explicarse por las distintas concentraciones utilizadas entre los estudios y por las diferencias genéticas entre las cepas estudiadas.

**Resistencia a antibióticos**

Esta prueba mostró a 16 cepas como resistentes a la mayoría de los antibióticos utilizados; Rhizojal TP1 y Rhizomich CR2 procedentes de los alrededores del Lago de Chapala, fueron susceptibles a los 12 antibióticos ensayados (Cuadro 4). Keneni *et al.* (2010) evaluaron la resistencia de siete cepas de *Rhizobium* a seis antibióticos; todos mostraron resistencia a cloranfenicol y penicilina y dos mostraron resistencia a cloranfenicol, penicilina, estreptomycin y tetraciclina; además, afirman que los aislados nativos presentaron mayor resistencia a los antibióticos, que los introducidos. También Hernández *et al.* (2012), quienes estudiaron 12 cepas y seis antibióticos, reportaron que todas las cepas crecieron en presencia de tetraciclina, cloranfenicol, ampicilina y ácido nalidíxico.

**Cuadro 2. Tolerancia de 20 cepas de *Rhizobium* a nueve valores de pH y cinco concentraciones de cloruro de sodio.**

Factores	Valores	Cepas																			
		Rhizojal VC1	Rhizojal VC2	Rhizojal VC3	Rhizojal BH1	Rhizojal BH2	Rhizojal BH3	Rhizojal SA1	Rhizojal SA2	Rhizojal SA3	Rhizojal ZMA1	Rhizojal ZMA2	Rhizojal ZGZ2	Rhizojal ZGZ3	Rhizojal ZCB3	Rhizojal ZAT1	Rhizojal ZAT2	Rhizojal TP1	Rhizojal TP3	Rhizomich CR1	Rhizomich CR2
pH	4.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	-
	5.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+
	5.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+
	6.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	6.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	7.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	7.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	8.0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	8.5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NaCl (%)	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-
	3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	5	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+: resistente (hubo crecimiento); -: sensible (no hubo crecimiento).

**Cuadro 3. Evaluación de 20 cepas de *Rhizobium* por su resistencia a cuatro metales pesados.**

Productos	Valores	Cepas																				
		Rhizojal VC1	Rhizojal VC2	Rhizojal VC3	Rhizojal BH1	Rhizojal BH2	Rhizojal BH3	Rhizojal SA1	Rhizojal SA2	Rhizojal SA3	Rhizojal ZMA1	Rhizojal ZMA2	Rhizojal ZGZ2	Rhizojal ZGZ3	Rhizojal ZCB3	Rhizojal ZAT1	Rhizojal ZAT2	Rhizojal TP1	Rhizojal TP3	Rhizomich CR1	Rhizomich CR2	
Sulfato de zinc (µg mL <sup>-1</sup> )	10	-	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-
	50	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulfato de magnesio (µg mL <sup>-1</sup> )	10	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-
	50	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
	100	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Sulfato de cobre (µg mL <sup>-1</sup> )	10	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cloruro de mercurio (µg mL <sup>-1</sup> )	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+: resistente (hubo crecimiento); -: sensible (no hubo crecimiento).

**Cuadro 4. Evaluación de 20 cepas de *Rhizobium* para resistencia a 12 antibióticos.**

Productos	Rhizojal VC1	Cepas																			
		Rhizojal VC2	Rhizojal VC3	Rhizojal BH1	Rhizojal BH2	Rhizojal BH3	Rhizojal SA1	Rhizojal SA2	Rhizojal SA3	Rhizojal ZMA1	Rhizojal ZMA2	Rhizojal ZGZ2	Rhizojal ZGZ3	Rhizojal ZCB3	Rhizojal ZAT1	Rhizojal ZAT2	Rhizojal TP1	Rhizojal TP3	Rhizomich CR1	Rhizomich CR2	
SXT	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
CTX	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-
CF	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-
FEP	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
LEV	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
NF	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-
CRO	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-
AM	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
NET	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-
CL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
AK	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-
GE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-

+: resistente (hubo crecimiento); -: sensible (no hubo crecimiento); SXT: trimetoprim-sulfametoxazol; CTX: cefotaxima; CF: cefalotina; FEP: cefepime; LEV: levofloxacina; NF: nitrofurantoína; CRO: ceftriaxona; AM: ampicilina; NET: netilmicina; CL: cloranfenicol; AK: amikacina; GE: gentamicina.

Los resultados de la caracterización bioquímica que incluyó tolerancia a pH y a cloruro de sodio, resistencia a metales y resistencia a antibióticos, indican que las cepas estudiadas pertenecen al género *Rhizobium*.

### Análisis de agrupamiento

El análisis de agrupamiento de las 20 cepas mediante coeficiente de correlación practicado con las 38 variables correspondientes a caracterización bioquímica, dio como resultado la formación de dos grupos principales, A y B, y dentro del grupo A, dos subgrupos A1 y A2 (Figura 1). Dentro de A integrado por 15 cepas, el subgrupo A1 con siete cepas, lo conformaron tres provenientes de frijol silvestre y cuatro de la forma domesticada; la mayoría de las cepas de este subgrupo mostró crecimiento en pH de 4.5, resistencia a metales y resistencia a los antibióticos ensayados. Hubo similitud de resultados entre las cepas Rhizojal VC1 y Rhizojal VC3, y Rhizojal MA1 y Rhizojal MA2, lo que podría indicar que se trata de la misma cepa en cada par, porque fueron colectadas y aisladas de plantas diferentes, pero en el mismo sitio.

Las ocho cepas del subgrupo A2 (cinco procedentes de frijol silvestre), mostraron crecimiento a pH de 4.5, a 3 % de NaCl, a las concentraciones de 10 y 50  $\mu\text{g mL}^{-1}$  de sulfato de magnesio y a 1  $\mu\text{g mL}^{-1}$  de sulfato de zinc, excepto Rhizojal ZGZ2. En este grupo destacan Rhizojal BH1, Rhizojal ZGZ2 y Rhizojal ZGZ3 por su resistencia a los 12 antibióticos probados. El alto coeficiente de correlación entre Rhizojal BH2 y Rhizojal BH3 indica que son cepas muy similares.

El grupo B constituido por cuatro cepas aisladas de frijol domesticado procedentes del área del Lago de Chapala, se distinguió por ser susceptible a pH ácido (4.5), a concentraciones bajas de sal (3 %) y a los antibióticos; además, mostraron similitud de resultados en cinco variables de caracterización morfológica: forma, color, aspecto, borde y textura (Cuadro 1). En el caso de Rhizojal VC2 colectado en raíces de frijol silvestre en el volcán Nevado de Colima, no mostró cercanía con ninguna otra cepa. Creció en todos los niveles de pH probados, fue el único que se desarrolló a la concentración de 5 % de NaCl y el único con resistencia a las concentraciones evaluadas de sulfato de zinc y sulfato de




Figura 1. Dendrograma elaborado con 38 variables resultado de la caracterización bioquímica de 20 cepas de *Rhizobium* mediante coeficiente de correlación.

magnesio. Se requieren estudios adicionales para verificar si se trata de una especie diferente.

La caracterización morfológica y bioquímica de las cepas estudiadas, evidencian la variabilidad genética de *Rhizobium* en el occidente de México y alto potencial para seleccionar cepas de *Rhizobium* de crecimiento rápido, resistentes a factores adversos como acidez del suelo y a niveles moderados de salinidad y con resistencia a antibióticos. Esta afirmación se basa en lo expresado tanto por Hernández *et al.* (2012), como por Abera *et al.* (2015), quienes señalan que los factores de supervivencia, persistencia y competitividad confieren a los rizobios ventajas adaptativas para sobrevivir y competir con otras bacterias del suelo, lo que favorece la colonización de las raíces de las leguminosas y la fijación de nitrógeno atmosférico.

### CONCLUSIONES

Los estudios de caracterización practicados a 20 cepas de bacterias, 11 procedentes de nódulos de frijol cultivado y nueve de frijoles silvestres de la región occidente de México, evidenciaron que se trata de bacterias del género *Rhizobium*. Las cepas exhibieron diferencias morfológicas y bioquímicas, y mostraron variabilidad fenotípica. Las cepas estudiadas presentaron diferencias marcadas de crecimiento en valores distintos de pH, en concentraciones de cloruro de sodio, en reacción a metales pesados y en respuesta a los antibióticos utilizados. Las cepas mostraron de manera general crecimiento rápido, tolerancia a valores de pH ácido, tolerancia a concentraciones moderadas de cloruro de sodio, susceptibilidad a metales pesados, y resistencia a antibióticos. La caracterización y estudios de agrupamiento de las 20 cepas de *Rhizobium* no mostraron diferencias morfológicas y bioquímicas entre cepas de poblaciones de frijol silvestre y de variedades domesticadas, con excepción de una cepa procedente de frijol silvestre del Nevado de Colima.

### BIBLIOGRAFÍA

- Abd-Alla M. H., F. M. Morsy, A-W. E. El-Enany and T. Ohyama (2012) Isolation and characterization of a heavy-metal-resistant isolate of *Rhizobium leguminosarum* bv. *viciae* potentially applicable for biosorption of Cd<sup>2+</sup> and Co<sup>2+</sup>. *International Biodeterioration and Biodegradation* 67:48-55.
- Abera T., E. Semu, T. Debele, D. Wegary and H. Kim (2015) Determination soil *Rhizobium* populations, intrinsic antibiotic resistance, nodulation and seed yield of faba bean and soybean in Western Ethiopia. *World Journal of Agricultural Sciences* 11:311-324.
- Ángeles-Núñez J. G. y T. Cruz-Acosta (2015) Aislamiento, caracterización molecular y evaluación de cepas fijadoras de nitrógeno en la promoción del crecimiento de frijol. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas* 6:929-942.
- Aserse A. A., L.A. Räsänen, F. Assefa, A. Hailemariam and K. Lindström (2012) Phylogeny and genetic diversity of native rhizobia nodulating common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) in Ethiopia. *Systematic and Applied Microbiology* 35:120-131.
- Berrada H., I. Nouioui, M. Iraqui H., N. El Ghachtouli, M. Gtari and K. Fikri B. (2012) Phenotypic and genotypic characterizations of rhizobia isolated from root nodules of multiple legume species native of Fez, Morocco. *African Journal of Microbiology Research* 6:5314-5324.
- CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical (1988) Simbiosis leguminosa-rizobio: Manual de Métodos de Evaluación, Selección y Manejo Agronómico. Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cali, Colombia. 194 p.
- Cuadrado B., G. Rubio y W. Santos (2009) Caracterización de cepas de *Rhizobium* y *Bradyrhizobium* (con habilidad de nodulación) seleccionados de los cultivos de frijol caupi (*Vigna unguiculata*) como potenciales bioinóculos. *Revista Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuticas* 38:78-104.
- Gauri, A. K. Singh, R. P. Batt, S. Pant, M. K. Bedi and A. Naglot (2011) Characterization of *Rhizobium* isolated from root nodules of *Trifolium alexandrinum*. *Journal of Agricultural Technology* 7:1705-1723.
- Granda M. K. I., A. Colás S., R. Cupull S., Y. Gutiérrez S. y R. Torres G. (2009) Caracterización e identificación genética de aislados de *Rhizobium* en el cultivo del fréjol común (*Phaseolus vulgaris* L.). *Centro Agrícola* 36:5-14.
- Granda M. K., M. Ochoa T., V. Ruilova V., F. Guamán D. y R. Torres G. (2014) Evaluación de cepas nativas de *Rhizobium* sobre parámetros fenotípicos en frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.). *Centro de Biotecnología* 3:25-37.
- Granda M. K., H. Paccha C., C. Campoverde S. y R. Torres G. (2013) Variabilidad de aislados diazotróficos simbióticos en diferentes condiciones agroecológicas del sur del Ecuador. *Centro de Biotecnología* 2:6-15.
- Hernández F. I., M. C. Nápoles G., G. Pérez H., P. R. Rosales J., R. Baños G. y J. F. Ramírez P. (2012) Caracterización fenotípica de aislados de rizobios procedentes de la leguminosa forrajera *Canavalia ensiformis*. *Cultivos Tropicales* 33:21-28.
- Keneni A., F. Assefa and P. C. Prabu (2010) Characterization of acid and salt tolerant *Rhizobial* strains isolated from faba bean fields of Wollo, Northern Ethiopia. *Journal of Agricultural Science and Technology* 12:365-376.
- López-Ildelfonso R. y R. Ramírez-Delgado (2010) Los Parientes Silvestres del Frijol Común en el Occidente de México. Orgánica Editores. Universidad de Guadalajara SINAREFI, Guadalajara, México. 64 p.
- Marquina M. E., N. E. González y Y. Castro (2011) Caracterización fenotípica y genotípica de doce rizobios aislados de diversas regiones geográficas de Venezuela. *Revista de Biología Tropical* 59:1017-1036.
- McFarland J. (1907) The nephelometer: an instrument for estimating the number of bacteria in suspensions used for calculating the opsonic index and for vaccines. *Journal American Medical Association* 49:1176-1178.
- Mendoza L. J. A y R. R. Bonilla B. (2014) Inefectividad y efectividad de rizobios aislados de suelos de la Costa Caribe colombiana en *Vigna unguiculata*. *Revista Colombiana de Biotecnología* XVI:84-89.
- Patil S. M., D. B. Patil, M. S. Patil, P. V. Gaikwad, S. B. Bhamburdekar and P. J. Patil (2014) Isolation, characterization and salt tolerance activity of *Rhizobium* sp. from root nodules of some legumes. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences* 3:1005-1008.
- Pérez G., G. Gómez, M. C. Nápoles y B. Morales (2008) Aislamiento y caracterización de cepas de rizobios aisladas de diferentes leguminosas en la región de Cascajal, Villa Clara. *Pastos y Forrajes* 31:151-159.
- Rodríguez M. M. N. (1993) Asociación *Rhizobium*-leguminosa In: Manual de Agromicrobiología. R. Ferrera C., M. C. A. González C. y M. N. Rodríguez M. (eds.). Editorial Trillas. México. pp:11-51
- Somasegaran P. and H. J. Hoben (1994) Handbook for Rhizobia: Methods in Legume-Rhizobium Technology. NifTAL Project. University of Hawaii Springer. New York. Hawaii, USA. 450 p.
- Sosa A., A. Elías, O. A. García y M. Sarmiento (2004) Aislamiento y caracterización fenotípica parcial de cepas de rizobios que nodulan leguminosas rastreras. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola* 38:197-201.
- Villanueva T. E. E. y A. Quintana D. (2012) Aislamiento y selección de bacterias nativas de rizobios fijadores de nitrógeno, a partir de nódulos radiculares de *Phaseolus vulgaris*. *REBIOL Revista Científica de la Facultad de Ciencias Biológicas* 32:24-30.



- Vincent J. M. (1970) A Manual for the Practical Study of Root-nodule Bacteria. IBP Handbook No. 15. International Biological Programme. Blackwell Scientific, Oxford-Edinburgh.164 p.
- Wei G. H., Z. Y. Tan, M. E. Zhu, E. T. Wang, S. Z. Han and W. X. Chen (2003) Characterization of rhizobia isolated from legume species within the genera *Astragalus* and *Lespedeza* grown in the Loess Plateau of China and description of *Rhizobium loessense* sp. nov.

- International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 53:1575-1583.
- Yadegari M. and H. A. Rahmani (2010) Evaluation of bean (*Phaseolus vulgaris*) seeds' inoculation with *Rhizobium phaseoli* and plant growth promoting *Rhizobacteria* (PGPR) on yield and yield components. *African Journal of Agricultural Research* 5:792-799.