ABSORCION DE HUMEDAD POR RAICES DE ESTOLONES EN Solanum cardiophyllum Lindl

Juan de Dios Rebolledo Vèlez¹, Alfonso Larque Saavedra² y Jose Luis Rodriguez Ontiveros²

RESUMEN

La función de las raices de estolones en la adaptación ecológica de la papa silvestre (Solanum cardiophyllum) ha sido poco investigada, por lo que el objetivo del estudio fue conocer la contribución de éstas en la absorción de agua. Se utilizaron raices de estolones de plantas desarrolladas bajo condiciones de invernadero durante 1986, en Chapingo, México, las cúales sumergidas en una solución fueron colorante de rojo congo al 1.5%. Las raices de los estolones resultaron funcionales para la absorción de agua y la forma de traslocación del agua en la planta fue similar a la de Solanum tuberosum. En plantas en etapa de tuberización se observó que el tubérculo madre sigue interactuando fisiològicamente con la planta. Con los datos encontrados se infiere la razón de la existencia de estolones largos en plantas bajo condiciones de sequia.

PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Papa silvestre, Traslocación de agua, Xilema, Solución colorante.

SUMMARY

Function and ecological importance of wild potato (Solanum cardiophyllum) stolon roots have been scarcely stu-Therefore, this work was perdied. formed to study the contribution of such roots in water uptake. Stolon roots of plants grown under greenhouse conditions at Chapingo, México in 1986, were utilized. These roots were submerged in a 1.5% red congo Results showed that stolon solution. roots were functionally active in water uptake and that the water translocation process in the plant was similar to that of Solanum tube-In plants at the tuberization stage, it was observed that the mother tuber still had physiological interaction with the plant. Some reasons for the existance of long stolons in plants under drought conditions are discussed according to these results.

ADDITIONAL INDEX WORDS

Wild potato, Water translocation, Xilem, Staining solution.

INTRODUCCION

Solanum cardiophyllum es una papa silvestre comestible, de uso potencial para cultivo en las zonas àridas (Galindo, semiaridas mexicanas 1982; Luna, 1983). Sin embargo, una de las limitantes que se ha detectado esta especie es su baja productividad, la cual se atribuye a que gran parte de los metabolitos de la planta se emplean en el alargamiento de los estolones, en lugar de canalizarlos hacia el crecimiento de los tubérculos. En consecuencia, se ha

Investigador Adjunto del Centro Regional para Estudios de Zonas Aridas y Semiáridas del Colegio de Postgraduados (CREZAS-CP). Iturbide No. 73, Salinas, S.L.P. México. CP 78600.

Profesores Investigadores del Centro de Botànica y Genética, respectivamente, del Colegio de Postgraduados, Montecillo, México. CP 56230.

planteado mejorar genéticamente esta especie mediante la reducción del tamaño de sus estolones (Galindo, 1982, 1986; Leal, 1986).

Desde el punto de vista ecològico. Rebolledo (1988) considera que la longitud del estolòn de S. cardiophyllum es una caracteristica adaptativa a las condiciones de déficit hidrico y ha demostrado que al eliminar los estolones de plantas bajo condiciones de sequia, la tasa de sobrevivencia se reduce en 50%, en comparación con la de plantas intac-Observò ademàs, que los estolones presentan una gran cantidad de raices adventicias que podrian ser funcionales en la absorción de hume-Este mismo tipo de dad del suelo. raices se ha observado en los estolones de Solanum tuberosum (Kratzke y Palta, 1985: Struckmeyer v Palta, 1986), los que se ha demostrado son funcionales para la absorción de humedad del suelo (Kratzke y Palta, Suponiendo que en S. cardiophyllum las raices de los estolones tienen la misma función, se podria explicar, al menos en parte, la importancia adaptativa de estolones largos en esta especie de papa. El presente estudio tuvo como objetivo conocer la contribución de las raices de los estolones en la absorción de agua.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realizó bajo condiciones de invernadero en Chapingo, Mêxico, durante el otoño de 1986. Se utilizaron raices de estolones de plantas de un clon de papa silvestre que proporcionó el laboratorio de Fisiologia Vegetal del Centro de Botànica del Colegio de Postgraduados. Las plantas se desarrollaron en macetas de 0.20 m de diàmetro por 1.0 m de longitud, con 13 kg de suelo.

En la etapa de tuberización, los estolones fueron removidos cuidadosamente de las plantas para evitar daños en las raices, y fueron sumergidos en un colorante indicador (solución de rojo congo al 1.5%), contenido en vasos de precipitado de 10 ml. El rojo congo es, según Conn (1953), el tinte mejor conocido como indicador biológico. Su molécula es C32H22N6O6S2Na2 y su peso molecular es de 696.658.

Las raices de los estolones permanecieron sumergidas en la solución colorante por periodos de 2, 5, 8 y 24 horas. Posteriormente se disectaron tres plantas en cada periodo, y con la ayuda de un microscopio estereoscópico se observó el avance del colorante en el tejido conductor. La coloración del xilema, en las diferentes partes de la planta, indicaba la absorción de agua y su forma de movilización.

RESULTADOS Y DISCUSION

Con la metodologia utilizada en el presente estudio, se comprobò que las raices de los estolones de S. cardiophyllum contribuyen de manera importante en la absorción de agua (Cuadro Por ello se infiere que, bajo condiciones naturales, la gran cantidad de raices del sistema estolonifero (aunado a los demás tipos de raices) forman un sistema radical quizà màs competitivo y eficiente para la absorción de humedad del Quizàs a eso se deba que esta especie tolere mejor las condiciones seguia que Zea mays (Galindo, 1982), Phaseolus vulgaris (Benavides, 1984) y Solanum tuberosum (Romero. 1985).

La forma de traslocación del agua en la planta fue evaluada cualitativamente al disectar ésta en diferentes partes, para observar la tin-

REBOLLEDO et al.

Cuadro 1. Movimiento de la solución colorante absorbida a través de las raices del estolón de plantas de S. cardiophyllum desarrolladas en invernadero.

Tiempo de observación (horas)	Organo de la planta					
	Estolôn	Tubérculos en formación	Ramificaciones primarias	Tallo	Hojas	Tubérculo madre
2	X	X	T # 0 8 8			100
5	χ	X	X			
8	X	X	X	Х		
24	χ	X	X	X	χ	X

X = Presencia de colorante en el tejido de conducción.

ción del xilema (Cuadro 1). La disección de la planta reveló que:

- A dos horas de sumergidas en la solución colorante, el agua absorbida por las raices de los estolones sólo había sido movilizada a los tubérculos en desarrollo de los mismos estolones.
- 2) En cinco horas, la coloración se encontraba presente en las primeras ramificaciones del tallo.
- 3) En ocho horas, la coloración estaba presente en todo el tallo y ramificaciones, aunque la coloración era tenue.
- 4) En 24 horas se presentaba una fuerte coloración en el xilema de toda la planta (estolones, tubérculos en formación, tallos y hojas), incluso en el tubérculo madre.

Esta forma de traslocación del aqua (absorbida a través de las raices de los estolones) en la planta, es similar a la encontrada por Kratzke y Palta (1985) en Solanum tuberosum. Sin embargo, en S. cardiophyllum se encontrò que el colorante también estaba presente en el tubérculo madre, lo cual indica que este sigue interactuando fisiològicamente con la planta. Los estudios de Rebolledo (1988) en la misma especie, señalan que el tubérculo madre puede constituir una reserva de metabolitos para la planta, los cuales pueden ser utilizados bajo condiciones de sequia.

De los resultados encontrados se concluye que las raices del estolón contribuyen en la absorción de agua, lo que debe de considerarse en los estudios de mejoramiento genético. Los programas genotécnicos que tengan como objetivo reducir la longitud del sistema estolonifero correrian el riesgo de eliminar este tipo de adaptación ecológica, la que probablemente influye para que esta especie sobreviva bajo condiciones de déficit hidrico.

BIBLIOGRAFIA

Benavides Meza, H.M. 1984. Resistencia a la sequia. XVI. Estudio preliminar de las relaciones agua-planta en Solanum cardiophyllum Lindl. y Phaseolus vulgaris L. Tesis Profesional. Universidad Nacional Autônoma de México. México. 152 p.

Conn, M.J. 1953. Biological Stains. The Williams & Wilkins Co. Baltimore, Maryland. U.S.A. 367 p.

Galindo Alonso, J. 1982. La "papita güera". Naturaleza 3:175-180.

_____. 1986. Programa de papita güera del Centro de Fitopato-logia del Colegio de Postgraduados. Memoria de la IV Reunión de Investigación sobre Papita Güera. Irapuato, Gto. pp. 2.

Kratzke, M.G. and J.P. Palta. 1985. Evidence for the existence of functional roots on potato tubers and stolons: significance in water transport to the tuber. Amer. Potato J. 52:227-236.

Leal, K.D.S. 1986. Cultivo de tejidos de papita güera (Solanum cardiophyllum y S. ehrenbergii). Memoria de la
IV Reunión de Investigación sobre Papita Güera. Irapuato, Gto. México. pp8.

Luna Cavazos, M. 1983. Distribución y aspectos ecológicos de la "papita sil vestre" Solanum cardiophyllum Lindl.) en el Altiplano Potosino-Zacatecano. Tesis Profesional. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. México 95 p.

Rebolledo Vélez, J.D. 1988. Resistencia a la sequia. XV. El papel de la raiz, del estolón y del tubérculo madre, en conferir resistencia a sequia en Solanum cardiophyllum Lindl. Tesis de Maestria en Ciencias. Colegio de Postgraduados. Chapingo, México. 83 p.

Romero Mora, J. 1985. Resistencia a la sequia. XX. Estudio comparativo de resistencia a sequia y eficiencia de uso de agua en dos especies de Solanum. Tesina. Universidad Autônoma Metropolitana. México. 100 p.

Struckmeyer, B.E. and J.P. Palta. 1986. Anatomical evidence for the existence of roots on potato tubers and stolons. Amer. Potato J. 63:57-60.