



## DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL Y ESTACIONAL DE *Dendroctonus adjunctus* Blandford y *Dendroctonus brevicomis* Leconte EN COAHUILA, MÉXICO

### ALTITUDINAL AND SEASONAL DISTRIBUTION OF *Dendroctonus adjunctus* Blandford AND *Dendroctonus brevicomis* Leconte IN COAHUILA, MEXICO

Cecilia G. Ruiz-González<sup>1</sup>, Jorge Méndez-González<sup>1\*</sup>, Víctor H. Cambrón-Sandoval<sup>2</sup>, Mario A. García-Aranda<sup>1</sup>, Juan C. Montoya-Jiménez<sup>1</sup> y Librado Sosa-Díaz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Buenavista Saltillo, Coahuila, México. <sup>2</sup>Universidad Autónoma de Querétaro. Juriquilla, Querétaro, México.

\*Autor para correspondencia (jmendezg@hotmail.com)

#### RESUMEN

Los bosques de pino (*Pinus* spp.) de todo el mundo están declinando debido al mal manejo, al cambio climático, incendios y ataques de insectos descortezadores (*Dendroctonus* spp.). El objetivo de este estudio fue evaluar la abundancia altitudinal y temporal de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* y su relación con la temperatura y características del rodal. Se establecieron dos transectos altitudinales a partir de 2600 hasta 3300 metros sobre el nivel del mar (msnm), usando trampas para insectos, cada trampa compuesta de ocho embudos, localizadas a intervalos de 100 m de altitud. Los insectos fueron recolectados cada dos semanas desde febrero 2015 a febrero de 2017. Los datos de temperatura y del rodal fueron obtenidos en cada sitio de muestreo. Los resultados indican que *D. adjunctus* y *D. brevicomis* fueron más abundantes por arriba de los 3000 msnm durante primavera y verano. La abundancia de descortezadores se correlacionó significativamente con la temperatura, área basal y densidad de los árboles. En conclusión, las características del bosque y las especies de pino presentes en el rodal determinan la abundancia de *D. adjunctus* y de *D. brevicomis* en la región.

**Palabras clave:** *Dendroctonus adjunctus*, *Dendroctonus brevicomis*, altitud, México, temperatura.

#### SUMMARY

Pine forests (*Pinus* spp.) across the world are declining due to inappropriate management, climate change, fires, and pine beetle (*Dendroctonus* spp.) attacks. The objective of this study was to evaluate altitudinal and temporal abundance of *D. adjunctus* and *D. brevicomis* and its relationship with temperature and stand characteristics. Two altitudinal transects were established from 2600 to 3300 meters above sea level (masl), using insect traps, each trap made up of eight funnels, located at 100 m intervals of altitude. Insects were collected every two weeks from February 2015 to February 2017. Temperature and stand data were obtained at each sampling site. Results indicated that *D. adjunctus* and *D. brevicomis* were more abundant above 3000 masl during spring and summer. Bark beetle abundance was significantly correlated with temperature, basal area and tree density. In conclusion, stand characteristics and pine species present in the stand determine abundance of *D. adjunctus* and *D. brevicomis* in the region.

**Key words:** *Dendroctonus adjunctus*, *Dendroctonus brevicomis*, altitude, Mexico, temperature.

#### INTRODUCCIÓN

Los bosques albergan gran diversidad de especies, protegen el suelo, contribuyen a la estabilidad del clima, proveen de bienes y servicios y proporcionan una amplia gama de productos maderables y no maderables (Bergh y Promis, 2011). Sin embargo, el cambio climático podría favorecer el desarrollo de plagas forestales o de especies invasoras en los bosques (Pérez *et al.*, 2007) y en este sentido se ha demostrado que la temperatura es el factor más importante debido a que influye en la supervivencia, mortalidad y en el número de generaciones de insectos, modificando la distribución geográfica de las plagas (Kocmánková *et al.*, 2010). Así mismo, cuando los bosques se ven afectados por factores de estrés, naturales o antropogénicos, se favorece el brote de plagas (Salinas *et al.*, 2010).

En México se cuenta con aproximadamente 42 % de las especies conocidas de *Pinus*, su distribución altitudinal varía entre 1500 y 4000 msnm (Perry, 1991; Sánchez, 2008). Los insectos descortezadores del género *Dendroctonus* son huéspedes de varias de estas especies de pinos; por los daños causados se les conoce como las plagas forestales más dañinas de los bosques de pino (Rodríguez *et al.*, 2013). Los descortezadores han causado la muerte de millones de árboles; en Canadá las pérdidas maderables han sido de hasta 2.5 millones de m<sup>3</sup> en los últimos 20 años (Miller y Borden, 2010). En México, los daños más notables se observaron recientemente. CONAFOR (2015) registró que entre 2004 y 2014 la superficie afectada fue de 30,365 ha, atribuidas a 12 especies de insectos descortezadores. Sánchez *et al.* (2003) encontraron en el estado de Coahuila brotes activos de *Dendroctonus* spp., afectando un volumen total de 36,749 m<sup>3</sup> de madera en rollo. Las especies de descortezadores registradas fueron: *D. adjunctus* Blandford, *D. brevicomis* LeConte, *D. pseudotsugae* Hopkins, *D. mexicanus* Hopkins, *D. parallelocollis*

Chapuis y *D. valens* LeConte.

*Dendroctonus adjunctus* es considerada como una plaga primaria y *D. brevicomis* como secundaria. La primera se distribuye ampliamente en la mayoría de los sistemas montañosos y la segunda presenta distribución restringida (Salinas-Moreno *et al.*, 2010). En México existe poca información sobre la abundancia a diferentes altitudes de estas especies. Algunos estudios relacionados con el tema fueron descritos por Salinas-Moreno *et al.* (2010), donde mencionan el intervalo de distribución altitudinal de 2500 a 3000 msnm y de 1680 a 3300 msnm, respectivamente. Rodríguez *et al.* (2010) mencionaron una distribución altitudinal de *D. adjunctus* de 1600 hasta 3929 msnm, con mayor incidencia de insectos en primavera y otoño. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la fluctuación poblacional, altitudinal y temporal de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* y su relación con temperatura y variables dasométricas del sitio en el ejido Santa Rita, en Arteaga Coahuila.

## MATERIALES Y MÉTODOS

### Descripción física y biológica del área de estudio

La localidad Santa Rita, en Arteaga Coahuila, se ubica entre 25° 17' 36" y 25° 16' 15" de latitud norte y entre 100° 30' 52" y 100° 27' 52" de longitud oeste. El clima es templado subhúmedo con lluvias escasas todo el año, variando de 300 a 700 mm anuales; su fórmula climática es BS1K (x'), el intervalo de temperatura es de 8 a 20 °C, con rango altitudinal del área entre 1300 y 3700 msnm. El tipo de vegetación es bosque de coníferas (INEGI, 2009), cuyas principales especies son: *Pinus rudis* Endl, *P. ayacahuite* Ehren, *Pseudotsuga menziesii* Mirb., *Abies vejarii* Martínez, *Ceanothus coeruleus* Lag, *C. buxifolius* Willd y *Garrya ovata* Benth (Cano *et al.*, 2007).

### Muestreo de insectos descortezadores

En el sitio de estudio se establecieron dos transectos (A y B) los cuales presentaban exposición sur. Cada transecto se conformó por ocho elevaciones, una cada 100 m, iniciando desde 2600 hasta 3300 msnm. A una altura de 1.5 m de un árbol no hospedero de cada elevación se colocó una trampa Lindgren® de ocho embudos con atrayente (frontalina, endo-brevicomina y alfa-pineno) y a 50 m en distancia horizontal se colocó una trampa sin atrayentes. El vaso colector de insectos se colgó sobre la trampa. Para conservar los insectos colectados se utilizó anticongelante marca PRESTONE AF EX al 33 %.

### Recolección de insectos, variables climáticas y datos dasométricos del sitio

El periodo de estudio fue de dos años (febrero 2015 a febrero 2017). Las trampas se revisaron cada 15 días, resultando en un total de 52 colectas. Los insectos capturados se llevaron al laboratorio para su identificación con apoyo de un estereoscopio LEICA modelo EZA y claves taxonómicas de Cibrián *et al.* (1995). En un árbol cercano a la trampa con feromona se instaló un data logger modelo EL-USB-2, a una altura aproximada de 1.5 m, el cual registró temperatura (°C), humedad relativa (%) y punto de rocío (°C) cada 30 minutos. La información almacenada se descargó cada seis meses usando el software EasyLogUSB. Para obtener las características del sitio se delimitó una parcela de forma cuadrada (50 x 50 m) tomando como punto central la trampa. De cada árbol se tomó la información: especie, diámetro normal (cm), altura total (m), diámetro de copa (m), densidad de copa (%), estado fitosanitario (sano e infestado), pendiente (%) y exposición (N, S, E y O). El equipo utilizado para medir estas variables fue: distanciómetro Leica DISTO™ D810 touch, densiómetro esférico convexo (DSM43), densiómetro esférico cóncavo (DSM43A), forcípula Haglöl Mantax, cinta diamétrica (283D/10M) y GPS Garmin (GPSMAP 64).

### Análisis de datos

Para caracterizar la distribución temporal y altitudinal de cada especie de descortezador, los datos de abundancia se organizaron en los siguientes niveles: por año, estación del año, altitud y transecto. Previo a la comparación y por ser información proveniente de conteos periódicos, los datos se sometieron a una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk ( $\alpha = 0.05$ ); al no cumplir con este supuesto, la comparación de abundancia de insectos en cada nivel se realizó usando la prueba no paramétrica de rangos de Kruskal-Wallis (KW) al 95 % de confiabilidad (Kruskal y Wallis, 1952). Para comparar la abundancia de cada especie de descortezador por año en cada transecto se usó el total de repeticiones sin importar la altitud ( $n = 208$  por especie por año). Entre transectos el análisis se realizó incluyendo el muestreo de ambos años sin importar la altitud ( $n = 416$  repeticiones por especie). En la comparación de abundancia de descortezadores entre estaciones, las repeticiones variaron desde  $n = 48$  hasta 52 (por el número de semanas, pero separadas por año de evaluación y por transecto). La comparación de abundancia entre altitudes incluyó el total de muestras por sitio sin importar el año ( $n = 52$ ).

Para comprobar si existe relación de la abundancia (promedio de 52 fechas de colecta, ambos años) de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* en cada sitio de muestreo (altitud) con la temperatura (promedio de todos los registros de temperatura de cada 30 minutos durante dos años) y con las características del sitio (área basal por hectárea, diámetro normal promedio por sitio, altura promedio por sitio y número de árboles por hectárea) se realizó un análisis de correlación de Spearman (n = 8 pares de datos, cada uno derivado del promedio de 52 muestreos). Los análisis estadísticos fueron realizados con el Software InfoStat 2016.

**RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

**Fluctuación de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* entre años y transectos**

La abundancia de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* en el transecto A durante el primer año de evaluación (28/02/15 - 20/02/16) fue más alta (p = 0.0178) que en el segundo año, con medias de 8.36 y 8.50 individuos por trampa para cada especie, mientras que en el segundo año la población fue de aproximadamente 4.5 individuos por trampa para ambas especies. En el transecto B la abundancia en ambas especies fue igual en los dos años (p = 0.9515 y 0.2033) (Cuadro 1). La abundancia de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* entre transectos fue diferente (p = 0.0001); en el transecto

A, con 6.33 y 6.36 individuos en promedio, hubo 2 a 4 veces más individuos que en el transecto B, con 2.63 y 1.64 insectos, respectivamente (Cuadro 1). Esto se debe a que en el transecto A el 33.3 % de las especies arbóreas son hospederas de descortezadores, y en B solo el 20.0 %. Tanto en A como en B, *P. rudis* es la especie hospedera dominante, incluso el 70 % de los árboles en las altitudes de 3100 a 3200 msnm en A son de *P. rudis*. La temperatura promedio en los transectos A y B (9.45 y 9.32 °C, respectivamente) es muy similar, por lo que la presencia de especies hospederas parece ser más importante (Cuadro 2).

Sánchez *et al.* (2003) reportaron brotes de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* en *Pseudotsuga menziesii*, *Abies vejarii*, *Pinus rudis*, *P. teocote* Schiede ex Schltdl, *P. pseudostrobus* Lindl y *P. arizonica* Engelm en la Sierra de Arteaga Coahuila, lo cual concuerda con las especies hospederas de este estudio (*P. rudis* y *Abies vejarii*). Torres y Sánchez (2006) mencionaron que bosques densos de *Pinus rudis* (466 árboles ha<sup>-1</sup>), son más susceptibles a brotes de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* debido a la competencia entre árboles y a la susceptibilidad de estrés. Los resultados obtenidos en el presente estudio comprueban que en el transecto A, con 378 árboles ha<sup>-1</sup>, hubo mayor densidad de arbolado, causando una mayor presencia de descortezadores. En Estados Unidos y Canadá las especies hospederas para *D. adjunctus* son *P. arizonica*, *Pinus engelmannii* Carr., *P. flexilis*, *Pinus leiophylla* Schiede ex Schltdl. & Cham.,

**Cuadro 1. Prueba de Kruskal-Wallis de la abundancia de *Dendroctonus adjunctus* y *D. brevicomis* entre años y transectos altitudinales en Santa Rita, Arteaga Coahuila, México.**

Especie	Transecto	Año	Rango	Medias	Gl	C	H	p
Comparación entre años (n = 208 por especie)								
<i>D. adjunctus</i>	A	21/02/16 - 18/02/17	196.68 b	4.31	1	0.72	4.02	0.0178
		28/02/15 - 20/02/16	220.32 a	8.36				
	B	28/02/15 - 20/02/16	208.79	3.31	1	0.64	0.0024	0.9515
		21/02/16 - 18/02/17	208.21	1.93				
<i>D. brevicomis</i>	A	21/02/16 - 18/02/17	198.43 b	4.23	1	0.74	2.92	0.0477
		28/02/15 - 20/02/16	218.57 a	8.50				
	B	28/02/15 - 20/02/16	213.90	2.28	1	0.52	0.84	0.2033
		21/02/16 - 18/02/17	203.10	1.00				
Comparación entre transectos (n = 416 por especie)								
<i>D. adjunctus</i>	B		399.77 b	2.62	1	0.68	4.03	0.0147
	A		433.23 a	6.33				
<i>D. brevicomis</i>	B		380.79 b	1.64	1	0.64	18.37	<0.0001
	A		452.21 a	6.36				

Medias con letras iguales por columna no son estadísticamente diferentes (Kruskal-Wallis, 0.05). Gl: grados de libertad, C: factor de corrección del estadístico por observaciones empatadas, H: estadístico de la prueba no corregido por empates, p: significancia estadística. Nota: la comparación por año incluyó el muestreo en todas las altitudes en ese año; en transectos se incluyeron ambos años de muestreo en todas las altitudes.

**Cuadro 2. Características dasométricas promedio en dos transectos altitudinales (A y B) en Santa Rita, Arteaga Coahuila, México.**

Altitud	AB (m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	Dn (cm)	H (m)	N (ha <sup>-1</sup> )	T (°C)	M (%)	Especies de coníferas (%)					
							Pm	Av	Pr	Pf <sup>†</sup>	Ps <sup>†</sup>	Pc
Transecto A												
2600	4.89	27.33	16.56	72.00	9.66	16.67	50.00	27.78	11.11	11.11		
2700	10.88	23.85	13.77	176.00	9.80	22.73	36.36	61.36	2.28			
2800	15.97	28.21	16.36	216.00	9.78	48.15	85.19	5.56	7.40		1.85	
2900	11.52	17.71	14.49	384.00	9.28	41.67	8.33	56.25	35.42			
3000	25.58	25.62	13.93	420.00	9.14	54.29	0.95		23.81		71.43	3.81
3100	22.74	26.26	13.50	352.00	9.38	69.32			30.68		69.32	
3200	26.01	17.90	9.11	816.00	9.39	69.61			29.90		70.10	
3300	20.91	19.12	9.21	584.00	9.20	68.49	2.74		47.26		50.00	
Transecto B												
2600	1.93	23.39	11.76	36.00	10.34	33.33	33.33				11.11	55.56
2700	14.43	35.52	17.25	132.00	10.22	45.45	81.82	3.03	15.15			
2800	9.19	26.58	12.50	124.00	10.15	25.81	48.39	25.81	12.90		12.90	
2900	19.58	20.53	10.02	508.00	9.52	41.73		28.35	70.08		1.57	
3000	12.31	25.17	11.47	180.00	9.04	31.11	2.22	20.00	75.56		2.22	
3100	21.21	18.77	12.40	616.00	8.69	35.06	11.04	59.09	27.92		1.95	
3200	19.18	22.77	12.13	344.00	8.81	40.70	53.49		40.70		5.81	
3300	48.29	27.03	17.04	744.00	7.78	70.97	29.57		16.13		54.30	

AB: área basal, Dn: diámetro normal, H: Altura total, N: número de árboles, T: temperatura promedio, M: mortalidad, Pm: *Pseudotsuga menziesii*, Av: *Abies vejarii*, Pr: *Pinus reflexa*, Pf: *Pinus flexilis*, Ps: *Pinus rudis*, Pc: *Pinus cembroides*, (†): especies hospederas.

*Pinus ponderosa* Douglass ex Lawson, *Pinus strobiformis* Engelm, mientras que *D. brevicomis* se presenta en *Pinus coulteri* D. Don y *P. ponderosa* (Bentz et al., 2010). En Coahuila las especies afectadas son *P. rudis*, *P. flexilis* y *Abies vejarii*; aunado a esto, se ha pronosticado que el aumento de temperatura (de 3 a 5 °C) para Estados Unidos y Canadá propiciará aumento en las poblaciones de plagas (Dukes et al., 2009).

**Fluctuación estacional de *D. adjunctus* y *D. brevicomis***

La abundancia de *D. adjunctus* fue estadísticamente diferente entre estaciones del año (p < 0.0001), siendo mayor en primavera del 2015 en ambos transectos con 19.46 (transecto A) y 8.35 (transecto B) insectos en promedio y casi nula en otoño del 2015 (n = 0.21 en transecto A y n = 0 en B) (Figura 1 A y 1 C). *D. brevicomis* presentó un patrón similar; las estaciones de mayor vuelo de descortezadores fueron verano del 2015 (transecto A) y primavera del 2015 (transecto B) promediando 15.64 y 6.13 insectos, respectivamente en cada estación. Otoño del 2015 y 2016 fueron las estaciones donde hubo menor presencia de *D. brevicomis* (n = 0.94 transecto A y n = 0.33 transecto B) (Figura 1 B y 1 D). En el transecto A las temperaturas más altas se

registraron en primavera y verano del 2015, siendo de 10 y 13 °C, respectivamente, ocurriendo aquí la mayor abundancia de insectos. En las estaciones con menor presencia de descortezadores (otoño 2015 y 2016) las temperaturas fueron de 9.10 y 8.83 °C (Figura 2 A); para el año 2016 se presentó un patrón similar en la abundancia de descortezadores (Figura 1 A y 1 B).

Primavera del 2015 se caracterizó por presentar temperaturas de hasta 13 °C y alta abundancia de descortezadores de hasta 400 en total (Figura 2 B), la mayor abundancia registrada en esta estación se debe a las temperaturas altas, ya que en las estaciones con menor presencia de descortezadores la temperatura fue menor a 10 °C. Los resultados obtenidos concuerdan con Sánchez-Martínez et al. (2008) y Rodríguez et al. (2010), al reportar primavera como la estación de mayor incidencia de descortezadores (n = 20 y 6.53 en promedio, respectivamente) en *P. arizonica* y *P. hartwegii* Lindl. Estos autores mencionan a otoño con alta incidencia de descortezadores, lo cual no concuerda con este estudio, ya que aquí otoño fue la estación con menor número de individuos. En el estado de Veracruz, en cambio, se observaron hasta 170 individuos de *D. adjunctus* en *P. rudis* durante la primavera (Rodríguez et al.,




Figura 1. Prueba de rangos de Kruskal-Wallis de la fluctuación temporal en el tamaño de población de *Dendroctonus adjunctus* (A y C) y *D. brevicornis* (B y D) en los transectos A (A y B) y B (C y D) en Santa Rita, Arteaga Coahuila, México. Las barras indican los valores medios (± error estándar). Medias con letras iguales (minúsculas) no son estadísticamente diferentes (Kruskal-Wallis, 0.05). Gl: grados de libertad, C: factor de corrección del estadístico por observaciones empataadas, H: estadístico de la prueba no corregida por empates, p: significancia estadística.

2013). Por su parte, Vázquez *et al.* (2007) mencionaron que la mayor fluctuación de *D. mexicanus* en Michoacán (ambos estudios en México) se presentó de marzo a junio, durante actividades de aprovechamiento, cuando los árboles fueron más susceptibles a ataques de insectos.

**Fluctuación altitudinal de *D. adjunctus* y *D. brevicornis***

La prueba de Kruskal-Wallis demostró que la mayor abundancia de *D. adjunctus* en ambos transectos (A y B) ocurre a los 3300 msnm (n = 12.62 transecto A y n = 9.75 transecto B) (Figura 3 A y 3 C). *D. brevicornis* mostró un patrón similar, mayor en el transecto A, a los 3000 msnm y en el transecto B a los 3300 msnm con medias de 18.92 y 4.62 insectos, respectivamente (Figura 3 B y 3 D). La menor cantidad de

insectos de ambas especies ocurrió de los 2600 a 2800 msnm. El intervalo altitudinal de 3000 a 3300 m se caracterizó por presentar alto porcentaje de la especie hospedera (*P. rudis*), mayor densidad del arbolado (400 a 800 árboles ha<sup>-1</sup>) en ambos transectos y alto porcentaje de mortalidad de árboles (hasta 70 % en ambos transectos) (Cuadro 2).

Los resultados obtenidos concuerdan con los intervalos de distribución altitudinal reportados por Salinas-Moreno *et al.* (2004; 2010) en México (*D. adjunctus* en intervalo de 3100 a 3500 msnm y *D. brevicornis* de 1680 a 3300 msnm). Estos autores también reportaron el mayor porcentaje de incidencias de *D. adjunctus* en *P. hartwegii* (58 a 83.3 %) y *D. brevicornis* en *P. durangensis* Martínez y *P. engelmannii* (31 a 40 %), lo cual no coincide con las especies hospederas




Figura 2. Fluctuación poblacional total de *Dendroctonus adjunctus* y *D. brevicomis* por fecha de colecta y su relación con temperatura promedio en los transectos A (A) y B (B) en Santa Rita, Arteaga Coahuila, México. Nota: en el eje "Y" se representa la abundancia total registrada en todas las altitudes en cada fecha de colecta. La temperatura es el promedio aritmético de todos los datos registrados por los sensores en todas las altitudes durante el periodo de una fecha de colecta a la siguiente, en cada transecto.

de este estudio. Los brotes de *D. adjunctus* en la Sierra Raspadura, Chihuahua se presentaron entre 2560 y 2860 msnm, debido a la mayor distribución de especies hospederas (*P. arizonica*) y altas densidades de *Pinus* (109 árboles ha<sup>-1</sup>) (Sánchez y Silva, 2008). En Arizona, U.S.A. el rango de distribución para *D. adjunctus* se encuentra aproximadamente entre 2500 y 2700 msnm y *D. brevicomis* entre 2050 y 2250, lo cual varía con el presente estudio, debido a la ubicación en la que se hizo el muestreo en este trabajo; de la misma forma, la mayor abundancia de insectos se atribuye a mayor densidad de especies hospederas (*Pinus ponderosa*) y temperaturas máximas de más de 14.5 °C (Hayes et al., 2008; Williams et al., 2008).

**Relación de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* con temperatura y variables del sitio**

Las correlaciones entre la abundancia de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* en los sitios a lo largo de los transectos fueron significativas ( $r > 0.70$  y  $p < 0.03$ ) en ambos transectos.

La abundancia de ambas especies de descortezadores se correlacionó positiva y significativamente con el área basal ( $r > 0.70$  y  $p < 0.05$ ), con el número de árboles por hectárea ( $r > 0.76$  y  $p < 0.04$ ), pero negativamente con la temperatura promedio en los sitios ( $r > 0.60$  y  $p < 0.08$ ) (Cuadro 3). Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los de Sánchez y Silva (2008), donde mencionan correlaciones significativas entre la abundancia de insectos con el área basal ( $r = 0.806$ ;  $p > 0.0001$ ). Hayes et al. (2008) demostraron que entre más área basal exista mayor será la abundancia y mayor el ataque de *Dendroctonus*. Los resultados obtenidos y los reportados por otros autores han demostrado que las características de los sitios de estudio (altitud, área basal, diámetro, especies hospederas y la densidad del arbolado) influyen en la fluctuación de los insectos descortezadores.

**CONCLUSIONES**

La mayor abundancia de *D. adjunctus* y *D. brevicomis*




Figura 3. Prueba de Kruskal-Wallis de los valores promedio del número de insectos de *Dendroctonus adjunctus* (A y C) y *D. brevicomis* (B y D) a lo largo del gradiente altitudinal de los transectos A (A y B) y B (C y D) en Santa Rita, Arteaga Coahuila, México. Las barras indican medias ( $\pm$  error estándar). Medias con letras iguales (minúsculas) no son estadísticamente diferentes (Kruskal-Wallis, 0.05). Gl: grados de libertad, C: factor de corrección del estadístico por observaciones empatadas, H: estadístico de la prueba no corregido por empates; p: significancia estadística.

Cuadro 3. Correlación entre variables del sitio y temperatura con *Dendroctonus adjunctus* y *D. brevicomis* (n = 8, promedio de 52 colectas) en dos transectos altitudinales en Santa Rita, Arteaga Coahuila, México.

		AB (m <sup>2</sup> ha <sup>-1</sup> )	Dn (cm)	H (m)	N ha <sup>-1</sup>	T (°C)	<i>D. adjunctus</i>
Transecto A							
<i>D. adjunctus</i>	r	0.9048	-0.5238	-0.8095	0.9762	-0.6429	
	p	0.0167	0.1658	0.0322	0.0098	0.0890	
<i>D. brevicomis</i>	r	0.8024	-0.2515	-0.5270	0.7785	-0.8862	0.8264
	p	0.0165	0.5479	0.1796	0.0229	0.0034	0.0114
Transecto B							
<i>D. adjunctus</i>	r	0.7143	-0.4286	-0.1190	0.7619	-0.7857	
	p	0.0588	0.2568	0.7528	0.0438	0.0376	
<i>D. brevicomis</i>	r	0.6905	-0.2619	-0.3095	0.7857	-0.7619	0.7857
	p	0.0677	0.4884	0.4128	0.0376	0.0438	0.0376

R: coeficiente de correlación de Spearman, p: significancia estadística, AB: área basal, Dn: diámetro normal promedio del sitio, H: altura total promedio del sitio, N: número de árboles, T: temperatura promedio. Nota. La abundancia usada en el análisis representa el promedio de 52 muestras comparado con el valor de las variables dasométricas y ambientales en cada sitio.

ocurre en primavera y verano debido a las altas temperaturas que se presentan en estas estaciones del año. La menor presencia ocurre en otoño e invierno. *D. adjunctus* se registró principalmente en la altitud de 3300 msnm, mientras que *D. brevicomis* entre 3000 y 3300 msnm, debido a las condiciones ambientales (microclima) y al número de especies hospederas que se presenta en cada altitud. La abundancia de insectos de *D. adjunctus* y *D. brevicomis* se correlacionó significativamente con el área basal, el número de árboles y la temperatura promedio del sitio. Queda de manifiesto que los brotes de descortezadores se pueden prevenir mediante tratamientos silvícolas, disminuyendo la densidad del arbolado y manejando el área basal para reducir la competencia entre las especies arbóreas existentes en el rodal.

### AGRADECIMIENTOS

Proyecto de investigación financiado por el Fondo Sectorial CONAFOR-CONACyT-2014, C01-234547.

### BIBLIOGRAFÍA

- Bentz B. J., J. Régnière, C. J. Fettig, E. M. Hansen, J. L. Hayes, J. A. Hicke, ... and S. J. Seybold (2010) Climate change and bark beetles of the Western United States and Canada: Direct and indirect effects. *Bioscience* 60: 602-613, <https://doi.org/10.1525/bio.2010.60.8.6>
- Bergh G. y A. Promis (2011) Conservación de los bosques nativos de Chile un análisis al Informe FAO sobre la Evaluación de los Recursos Forestales Nacionales. *Revista Bosque Nativo* 48: 9-11.
- Cano P. A., O. U. Martínez B. y A. Quiñonez Ch. (2007) Caracterización y diagnóstico del medio físico de la microcuenca Santa Rita del municipio de Arteaga, Coahuila. INIFAP-CIRNE. Campo Experimental Saltillo. Publicación Especial Núm. 13. Coahuila, México. 44 p.
- Cibrián T. D., J. T. Méndez M., R. Campos B., H. O. Yates III. y J. E. Flores L. (1995) Insectos Forestales de México/Forest Insects of México. Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México, México. 453 p.
- CONAFOR, Comisión Nacional Forestal (2015) Superficie forestal afectada por plagas y enfermedades forestales. Base de Datos Estadísticos-Badesniarn. [http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/aprooot/dgeia\\_mce/html/mce\\_index.html?De=BADESNIARN](http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/aprooot/dgeia_mce/html/mce_index.html?De=BADESNIARN). (Julio 2016).
- Dukes J. S., J. Pontius, D. Orwig, J. R. Garnas, V. L. Rodgers, N. Braze, ... and M. Ayres (2009) Responses of insect pests, pathogens, and invasive plant species to climate change in the forests of northeastern North America: What can we predict? *Canadian Journal of Forest Research* 39:231-248, <http://10.1139/X08-171>
- Hayes Ch. J., T. E. DeGomez, K. M. Clancy, K. K. Williams, J. D. McMillin and J. A. Anhold (2008) Evaluation of funnel traps for characterizing the bark beetle (Coleoptera: Scolytidae) communities in Ponderosa Pine forests of North-Central Arizona. *Journal of Economic Entomology* 101:1253-1265. [http://dx.doi.org/10.1603/0022-0493\(2008\)101\[1253:EOFTFC\]2.0.CO;2](http://dx.doi.org/10.1603/0022-0493(2008)101[1253:EOFTFC]2.0.CO;2)
- INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2009) Puntuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Arteaga, Coahuila de Zaragoza. Clave geográfica 05004. <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/05/05004.pdf>.
- Kocmánková E., M. Trnka, J. Eitzinger, H. Formayer, M. Dubrovský, D. Semerádová, ... and M. Možný (2010) Estimating the impact of climate change on the occurrence of selected pests in the Central European region. *Climate Research* 44:95-105, <http://10.3354/cr00905>
- Kruskal W. H. and A. Wallis W. (1952) Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association* 47:583-621, <http://10.2307/2280779>
- Miller D. R. and J. H. Borden (2010) Dose-dependent and species-specific responses of pine bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) to monoterpenes in association with pheromones. *The Canadian Entomologist* 132:183-195, <https://doi.org/10.4039/Ent132183-2>
- Pérez C. J., B. Locatelli, R. Vignola y P. Imbach B. (2007) Importancia de los bosques tropicales en las políticas de adaptación al cambio climático. *Revista Recursos Naturales y Ambiente* 51-52:4-11.
- Perry J. P. (1991) The Pines of Mexico and Central America. Timber Press. Portland, Oregon, USA. 231 p.
- Rodríguez O. A., A. Equihua M., J. Cibrián T., E. G. Estrada V., J. T. Méndez M., J. Villa C. y R. M. Barrón Y. (2013) Fluctuación de *Dendroctonus adjunctus* (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) y sus depredadores atraídos por frontalina + alfa-pineno, en los Pescados, Veracruz, México. *Revista Chilena de Entomología* 38:41-50.
- Rodríguez O. A., A. Equihua M., J. Cibrián T. y E. G. Estrada V. (2010) Fluctuación de *Dendroctonus adjunctus* Blandford (Curculionidae: Scolytinae) y sus depredadores atraídos por frontalina + alfa-pineno, en la estación experimental de Zoquiapan, Edo. de México. *Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle* 11:20-27.
- Salinas M. Y., A. Ager, C. F. Vargas, J. L. Hayes and G. Zúñiga (2010) Determining the vulnerability of Mexican pine forests to bark beetles of the genus *Dendroctonus* Erichson (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). *Forest Ecology and Management* 260:52-61. <http://10.1016/j.foreco.2010.03.029>
- Salinas-Moreno Y., M. G. Mendoza, M. A. Barrios, R. Cisneros, J. Macías-Samano and G. Zúñiga (2004) Areography of the genus *Dendroctonus* (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in Mexico. *Journal of Biogeography* 31:1163-1177. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2004.01110.x>
- Salinas-Moreno Y., C. F. Vargas M., G. Zúñiga, J. Víctor, A. Ager y J. L. Hayes (2010) Atlas de distribución geográfica de los descortezadores del género *Dendroctonus* (Curculionidae: Scolytinae) en México. Instituto Politécnico Nacional, Comisión Nacional Forestal. 90 p.
- Sánchez G. A. (2008) Una visión actual de la diversidad y distribución de los pinos de México. *Madera y Bosques* 14:107-120.
- Sánchez M. G. y S. Silva R. (2008) Caracterización de un brote de *Dendroctonus adjunctus* registrado en el estado de Chihuahua. INIFAP. Campo Experimental Pabellón. Folleto técnico Núm. 38. Aguascalientes, México. 48 p.
- Sánchez S. J. A., L. M. Torres E., A. Cano P. y O. U. Martínez B. (2003) Daños y diversidad de insectos descortezadores de coníferas del Noreste de México. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales* 28:41-56.
- Sánchez-Martínez G., R. Narváez-Flores y J. A. Olivo-Martínez (2008) Ciclo biológico y patrón estacional del descortezador de las alturas (*Dendroctonus adjunctus* Blandford) en la Sierra la Raspadura, Chihuahua. INIFAP. Campo Experimental Pabellón. Folleto técnico Núm. 37. Aguascalientes, México. 31 p.
- Torres E. L. M. y J. A. Sánchez S. (2006) Determinación de la fluctuación estacional de *Dendroctonus adjunctus* Blandford en *Pinus rudis* mediante el uso de feromonas. INIFAP-CIRNE. Campo Experimental Saltillo. Folleto Técnico Núm. 27, Coahuila, México. 39 p.
- Vázquez C. I., G. Sánchez M. y S. Madrigal H. (2007) Fluctuación poblacional de *Dendroctonus mexicanus* Hopk., bajo dos condiciones de manejo forestal en Michoacán, México. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales* 32:57-77.
- Williams K. K., J. D. McMillin, T. E. DeGomez, K. M. Clancy and A. Miller (2008) Influence of elevation on bark beetle (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) community structure and flight periodicity in Ponderosa pine forests of Arizona. *Environmental Entomology* 37:94-109, [http://dx.doi.org/10.1603/0046-225X\(2008\)37\[94:IOE0BB\]2.0.CO;2](http://dx.doi.org/10.1603/0046-225X(2008)37[94:IOE0BB]2.0.CO;2)