

VIABILIDAD Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE SEIS ESPECIES DE *Tillandsia* (BROMELIACEAE) DE OAXACA, MÉXICO

SEED VIABILITY AND GERMINATION OF SIX SPECIES OF *Tillandsia* (BROMELIACEAE) FROM OAXACA, MÉXICO

Diana Sosa-Luría¹, José L. Chávez-Servia^{1*}, Demetria Mondragón-Chaparro¹, Julio A. Estrada-Gómez² y Porfirio Ramírez-Vallejo²

¹ CIIDIR-Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional. Hornos 1003, Santa Cruz Xoxocotlán. 71230, Oaxaca, México. ²Posgrado en Recursos Genéticos y Productividad-Genética, Colegio de Postgraduados. Km. 36.5 Carr. México-Texcoco. 56230, Montecillo, Texcoco, Estado de México.

*Autor para correspondencia (jchavez@ipn.mx)

RESUMEN

Para diseñar estrategias de conservación *ex situ* e *in situ* de los acervos genéticos mexicanos de las especies nativas de *Tillandsia*, es fundamental un mejor entendimiento de la ecofisiología de la semilla. Por ello, en este trabajo se evaluó la viabilidad y capacidad germinativa de la semilla de seis especies del género *Tillandsia* (Bromeliaceae). La semilla se recolectó de febrero a julio de 2010 en bosques de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca. La viabilidad se midió mediante la prueba de rayos X y la germinación en una incubadora a temperatura constante de 25 °C y fotoperiodo neutro. En ambas pruebas los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar con un mínimo de seis repeticiones de 50 semillas. Los resultados se analizaron con comparación múltiple de medias y una correlación de Pearson. Hubo diferencias ($P \leq 0.05$) entre especies para porcentaje de semillas completas (viables o completamente desarrolladas) y de semillas con desarrollo incompleto. *T. violacea* presentó los más bajos porcentajes de semillas completas (61.3 %) y altos porcentajes de semillas con desarrollo parcial (31.6 %), en comparación con *T. prodigiosa*, *T. carlos-hankii*, *T. bourgaei*, *T. makoyana* y *T. fasciculata* que presentaron entre 68.3 y 89.0 % de semillas completas y entre 4.5 y 15.0 % de semillas parcialmente desarrolladas. *T. bourgaei* presentó el mayor porcentaje en su capacidad germinativa (83.3 %), seguida de *T. makoyana* (79.8 %), *T. carlos-hankii* (79.5 %), *T. prodigiosa* (75.8 %), *T. fasciculata* (45.0 %) y *T. violacea* (15.2 %). Hubo correlación positiva y significativa ($r = 0.69$, $P < 0.05$) entre los porcentajes de semillas completas y semillas germinadas.

Palabras clave: *Tillandsia*, poblaciones silvestres, rayos X, tasa de germinación.

SUMMARY

Understanding the seed ecophysiology of native species of *Tillandsia* is crucial to design *ex situ* and *in situ* conservation strategies for Mexican gene pools. In the present work, seed viability and germination capability of six species of the *Tillandsia* (Bromeliaceae) genus were evaluated using seed collected from February to July 2010, at Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca forest. All seed lots were evaluated by X-rays and germination tests (at constant temperature of 25 °C and neutral photoperiod), both tests under a completely random design with a minimum of 6 replicates of 50 seeds each. Significant differences ($P < 0.05$) were observed among *Tillandsia* species in relation to full or complete

(viable or structures completely developed) and incomplete seed percentages. *T. violacea* presented the lower percentage of full seeds (61.3 %) and higher percentage of seeds with structures partially developed (31.6 %), compared to *T. prodigiosa*, *T. carlos-hankii*, *T. bourgaei*, *T. makoyana* and *T. fasciculata* which showed values between 68.3 and 89 % of full seeds and 4.5 to 15.0 % of incomplete seeds. *T. bourgaei* presented the highest percentage of germination capability (83.3 %), followed by *T. makoyana* (79.8 %), *T. carlos-hankii* (79.5 %), *T. prodigiosa* (75.8 %), *T. fasciculata* (45.0 %) and *T. violacea* (15.16 %). A positive and significant correlation ($r = 0.69$, $P < 0.05$) was determined between the percentages of full seed from the X-rays test and germinated seeds in the germination test.

Index words: *Tillandsia*, wild populations, X-rays, germination rate.

INTRODUCCIÓN

Un ejemplo de la biodiversidad en México es la familia Bromeliaceae la cual incluye 18 géneros que agrupan a 342 especies. En particular, el género *Tillandsia* es el más abundante ya que posee 192 especies, 133 de ellas son endémicas y están ampliamente distribuidas en diversas condiciones ambientales y de vegetación (Espejo *et al.*, 2004; Espejo-Serna *et al.*, 2007).

En México, diferentes especies de la esta familia se encuentran en riesgo de extinción como consecuencia de la pérdida de la vegetación, ya que más de la tercera parte de los bosques y selvas han sido deforestados (Ricker *et al.*, 2007), y por la extracción ilegal (Flores-Palacios y Valencia-Díaz 2007; Mondragón, 2009), entre otras causas. En las normas oficiales mexicanas NOM-059-SEMARNAT-2002 y NOM-059-SEMARNAT-2010, 21 especies de bromelias endémicas se enlistan en las categorías de amenazadas y sujetas a protección especial.

Ante este riesgo, una estrategia inmediata es su conservación *ex situ* en bancos de germoplasma o la conservación *in situ* en zonas oficialmente declaradas como “reserva”, complementada con acciones que eviten la deforestación de bosques donde se localizan las poblaciones endémicas y la extracción ilegal de individuos de dichas especies. En cualquier caso, las estrategias o acciones a favor de la conservación deben partir del entendimiento de la dinámica de las poblaciones silvestres. En particular, para implementar una estrategia de conservación *ex situ* y el manejo eficiente del germoplasma en un banco, se necesita información básica de las características fisiológicas de las semillas y de las condiciones óptimas de almacenamiento (Engels y Visser, 2003).

Las semillas del género *Tillandsia* miden menos de 5 mm; poseen cubierta semiplumosa, endospermo, un cotiledón, vestigios de hojas primarias y secundarias, ápice del brote, e hipocotilo. El embrión llena sólo un tercio del volumen total y siempre ocupa la posición opuesta al punto de inserción de la pared del ovario. Contienen un apéndice

epidérmico plumoso, por lo que su dispersión es anemócora. Cada semilla se inserta, mediante su apéndice, en una cápsula dehiscente que al abrirse las transporta por el aire. El apéndice funciona como “adherente” a los troncos y ramas de los árboles, y permite la absorción de agua (Esteba, 2002; Wester y Zotz, 2011).

En la familia Bromeliaceae existe información acerca de la demografía de las poblaciones silvestres, morfología de plantas y mecanismos de dispersión de semillas. Sin embargo, son pocos los trabajos relacionados con la capacidad germinativa y los factores determinantes de la viabilidad de sus semillas. Los principales géneros estudiados, en aspectos de semillas, son: *Dyckia* (Pompelli *et al.*, 2006; Vieira *et al.*, 2007; Duarte *et al.*, 2010); *Encholirium* (Tarré *et al.*, 2007); *Alcantarea*, *Pitcairnia* y *Vriesea* (Pereira *et al.*, 2009; Pereira *et al.*, 2010a); *Aechmea* (Pinheiro y Borghetti, 2003); *Puya* (Vadillo *et al.*, 2004); *Pseudananas* (Vieira y Silveira, 2010); *Nidularium* (Pereira *et al.*, 2010b); *Tillandsia* (Mondragón y Calvo-Irabién, 2004; Montes-Recinas *et al.*, 2012) y *Catopsis* (Palací *et al.*, 2004; Wester y Zotz, 2011). En las especies endémicas mexicanas de *Tillandsia* es escasa o nula la información disponible sobre semillas.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la viabilidad y germinación de semillas de seis especies silvestres de *Tillandsia* L. distribuidas en los bosques de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección de material biológico

Se seleccionaron cinco especies endémicas de *Tillandsia* (*T. carlos-hankii*, *T. prodigiosa*, *T. bourgaei*, *T. violacea*, y *T. makoyana*) y *T. fasciculata*, todas reportadas con algún tipo de uso (Mondragón y Villa, 2008; Mondragón, 2009), que se distribuyen en los bosques templados de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca. Esta región forma parte de la Sierra Norte de Oaxaca, México. En la zona de colecta el clima varía de semicálido-subhúmedo con lluvias en verano a semifrío-subhúmedo con lluvias en verano; la isoterma media anual oscila entre 11 y 16 °C; y la precipitación media anual varía de 600 a 1300 mm (García, 2004). La recolección de semillas se hizo de febrero a junio de 2010. En el Cuadro 1 se presenta una descripción general de la localización y características de inflorescencias y de semillas colectadas.

Muestreo de semillas. Una vez que las poblaciones se ubicaron, al ocurrir la dispersión de semillas se recolectaron tres o cuatro cápsulas de color café-marrón de 50 individuos por población y por especie localizadas en un radio de 500 m, con base en los criterios propuestos por Hay y Smith (2004). Debido a la naturaleza epífita del género,

cada individuo muestreado se encontraba en fororito distinto. En el caso de *T. fasciculata* y *T. violacea*, se recolectaron semillas de algunos individuos en proceso de dispersión, debido a la escasa disponibilidad de cápsulas cerradas en esas poblaciones. Las cápsulas se secaron a la sombra en un lugar seco, fresco y ventilado (13 a 25 °C y 20 a 40 % de humedad relativa) durante cuatro semanas, y una vez que las cápsulas abrieron se extrajo la semilla.

Evaluaciones de viabilidad y capacidad germinativa

Las pruebas de viabilidad y germinación se efectuaron en el Laboratorio de Semillas del Banco de Germoplasma de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del Gobierno del Estado de Oaxaca, México.

La viabilidad o calidad física de la semilla de las seis especies de *Tillandsia* se evaluó con la técnica de rayos X, en una muestra aleatoria de 200 semillas visualmente identificadas como sanas. Se empleó un diseño experimental completamente al azar, con cuatro repeticiones de 50 semillas cada una. Las semillas se pegaron a una placa de plástico autoadherible de polipropileno, la que se colocó sobre una placa de acrílico transparente en la cámara de irradiación no digital (Faxitron X-Ray modelo MX-20; Specimen Radiography System®, Illinois, USA) y se sometió a exposiciones a 18 kV por 10 s. Posteriormente, las placas se revelaron en una impresora digital para rayos X (procesador Hope X-Ray; Micro-Max modelo 319®). Finalmente, en cada placa radiográfica se aplicó los criterios sugeridos por Dos Santos *et al.* (2009) para contar: (i) semillas sanas (con estructuras completamente desarrolladas), (ii) semillas parcialmente desarrolladas (semillas con daño estructural o malformadas), y (iii) semillas vanas (sin estructuras internas desarrolladas). Las variables se expresaron en porcentaje.

La capacidad germinativa de las semillas de *T. bourgaei*, *T. prodigiosa*, *T. carlos-hankii* y *T. makoyana* se evaluó en un diseño completamente al azar con 12 repeticiones de 50 semillas cada una y con seis repeticiones de igual número de semillas en *T. violacea*, y *T. fasciculata*. Esto último debido a la baja disponibilidad de semillas durante la colecta. Las semillas de cada repetición se distribuyeron en una caja Petri de vidrio de 10 cm de diámetro previamente esterilizada, que contenía papel filtro al que se agregó 4 mL de agua destilada. Las cajas Petri se colocaron en una cámara de germinación (Light-Dark Seedburo®) con fotoperiodo neutro (12 horas luz y 12 horas oscuridad) y temperatura constante de 25 °C.

Una vez germinadas las primeras semillas, lo cual ocurrió 3 d después de la siembra (dds), cada 24 h se contaron las semillas germinadas (con elongación del hipocotilo visible a simple vista) durante 20 d consecutivos hasta que la

Cuadro 1. Descripción general de la distribución, morfología y recolecta de semilla de seis especies de *Tillandsia*.

Descriptor general	Especie de <i>Tillandsia</i> [†]		
	<i>carlos-hankii</i>	<i>makoyana</i>	<i>prodigiosa</i>
Hábitat o vegetación asociada (distribución)	Pino-encino (1900-2900 msnm)	Pino-encino (50-2320 msnm)	Pino-encino (1800-2800 msnm)
Características de la inflorescencia	Cilíndrica de 57 a 70 cm de long., corola verde	Erecta paniculada de hasta 1 m, flores violetas	Tipo péndula, bipinnada, subcilíndrica, 30 a 60 cm, corola verde cremoso
Flores por eje floral (aprox.)	70	25	30
Semillas por cápsula (aprox.)	200 a 250	80 a 100	180 a 200
Época de dispersión de semillas	Noviembre-Abril	Noviembre-Abril	Noviembre-Marzo
Paraje de origen de semillas en Santa Catarina Ixtepeji	Petenera: 17.12281° LN, 96.3525° LO y 2520 msnm	Xhia: 17.16389° LN, 96.31515° LO y 1846 msnm	El Vivero: 17.1304° LN, 96.57199° LO y 2404 msnm
Fecha de recolecta (dd/mm/aaaa)	20/02/2010	07/03/2010	08/03/2010
	Especie de <i>Tillandsia</i> [†]		
	<i>bourgaei</i>	<i>fasciculata</i>	<i>violacea</i>
Hábitat o vegetación asociada (distribución)	Encino-pino (600-3100 msnm)	Encino y selvas bajas (1500-2000 msnm)	Encino-pino, mesófilo de montaña, pino-encino (600-3100 msnm)
Características de la inflorescencia	Erecta, cilíndrica, 26 a 30 cm, corola verde o amarillo verdusco	Paniculada, 25 a 60 cm de long., corola violeta	Inflorescencia colgante, 15 a 35 cm de long., corola tubular violeta
Flores por eje floral (aprox.)	30	8	10
Semillas por cápsula (aprox.)	200 a 250	80 a 120	200 a 250
Época de dispersión de semillas	Marzo-Mayo	Mayo-Julio	Marzo-Junio
Paraje de origen de semillas en Santa Catarina Ixtepeji	El Cerezal: 17.1596° LN, 96.3589° LO y 2245 msnm	Xhia: 17.18072° LN, 96.31359° LO y 1514 msnm	Peña Prieta: 17.09413° LN, 96.38103° LO y 2835 msnm
Fecha de recolecta (dd/mm/aaaa)	09/03/2010	03/03/2010 y 19/07/2010	20/02/2010 y 27/06/2010

[†]Fuentes: Smith y Downs (1974), Espejo-Serna *et al.* (2007), Mondragón y Villa (2008), y experiencias previas de los autores.

germinación se estabilizó. Con esta información se estimó el porcentaje de germinación total, la tasa de germinación [TG = Σ (núm. semillas germinadas al i-ésimo día/tiempo en días a la i-ésima evaluación)] y el tiempo medio a 50 % de germinación (T50%, en días).

Análisis estadístico

Las variables expresadas en porcentaje se transformaron mediante la expresión arcoseno ($\sqrt{\%}$) (Steel y Torrie, 1985) previo al análisis de varianza. La comparación múltiple de medias se hizo mediante la prueba de Tukey ($P \leq 0.05$). También se hizo un análisis de correlación simple de Pearson ($P \leq 0.05$) entre el porcentaje de semillas germinadas y el porcentaje de semillas sanas visualizadas en la prueba de rayos X. Todos los análisis se hicieron con el paquete estadístico SPSS (versión 11.0 para Windows).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hubo diferencias significativas entre especies en el porcentaje de semillas sanas y semillas con embriones parcialmente desarrollados, pero no para el porcentaje de semillas vanas (Cuadro 2). La presencia de un alto porcentaje de semillas con embrión parcialmente desarrolladas y vanas (entre 11 y 39.1 %), que a simple vista parecían sanas, muestran que el uso de la prueba de rayos X puede ser útil para evaluar estos atributos de semillas en la subfamilia Tillandsioidea que se caracterizan por sus tamaños pequeños (< 5mm).

Las imágenes radiográficas de las semillas de *Tillandsia violacea* mostraron que, en promedio, una alta proporción (31.6 %) no presentaban las estructuras internas

Cuadro 2. Porcentajes de semillas complemente desarrolladas (viables o sanas), parcialmente desarrolladas y vacías en seis especies de *Tillandsia*, según la prueba de rayos X.

Especie	Sanas (%)	Con embrión parcialmente desarrollado (%)	Vacías (%)
<i>T. prodigiosa</i>	79.4 a [†]	15.0 a	5.6 a
<i>T. carlos-hankii</i>	89.0 a	4.5 a	6.5 a
<i>T. bourgaei</i>	86.3 a	7.5 a	8.1 a
<i>T. makoyana</i>	83.4 a	7.9 a	8.7 a
<i>T. fasciculata</i>	68.3 a	14.0 a	17.7 a
<i>T. violacea</i>	61.3 b	31.6 b	8.1 a
Promedio	63.2	20.2	15.7
CV (%)	9.7	8.2	8.4
Valor de F	4.7	16.5	1.5 ns

[†]En columna, porcentajes con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05); ns = no significativo a nivel $P > 0.05$; cv = coeficiente de variación

completamente desarrolladas (Cuadro 2). Estos resultados describen parte de las dificultades de campo en conseguir semillas de *T. fasciculata* y *T. violacea*, de las cuales fue necesario coleccionar semilla en dos épocas (Cuadro 1), lo que posiblemente afectó las respuestas. Al respecto, Scatena *et al.* (2006) indican que las condiciones micro-ambientales en las que se desarrolla la planta madre afectan el desarrollo o maduración de las semillas de *Tillandsia*. Por ejemplo, el apéndice plumoso, característico del género, puede variar en longitud, y el cotiledón puede no desarrollarse. Este efecto también es común en árboles forestales de dispersión anemócora de semillas (Schmidt, 2007).

Tillandsia prodigiosa, *T. carlos-hankii*, *T. bourgaei*, *T. makoyana* y *T. fasciculata* no difirieron significativamente en porcentaje de semillas completas, parcialmente desarrolladas y vanas (Cuadro 2). En estas especies, la suma de semillas con estructuras completas y con desarrollo parcial fue superior a 80 %, con amplia posibilidad de originar plántulas normales, como encontraron Machado y Cícero (2003) en *Lithraea molleoides* (Anacardiaceae) y Oliveira *et al.* (2003) en *Peltophorium dubium* (Caesalpiniaceae).

Las especies con mayor porcentaje de semillas con estructuras completas presentaron los mayores porcentajes de germinación (Cuadro 2, Figura 1). Todas las especies de *Tillandsia* iniciaron su germinación (hipocotilo visible) a partir del día 3 después de la siembra, y la estabilización de germinación total se observó a partir del día 19 en la mayoría de las especies, excepto en *T. fasciculata* y *T. violacea* donde la estabilización ocurrió a los 7 dds (Figura 1). En la bromelia *Dyckia goehringii*, Duarte *et al.* (2010) indicaron que el inicio de germinación fue a los 4 d y la estabilización a los 14 d; y en *Aechmea bracteata* fue a los 5 y 20 d, respectivamente (Goode y Allen, 2009). Los resultados aquí mostrados se ubican dentro de los rangos determinados

para la familia Bromeliaceae. Cabe señalar que las semillas no germinadas se contaminaron con hongos.

El porcentaje de germinación fue diferente ($P \leq 0.05$) entre especies. La germinación de las semillas de *Tillandsia prodigiosa*, *T. carlos-hankii*, *T. makoyana* y *T. bourgaei* varió de 75.8 a 83.3 %, y fue mayor a la de *T. fasciculata* (45.0 %) y *T. violacea* (15.2 %) (Cuadro 3). Esto indica que las especies con menores porcentajes de semillas sanas y altos porcentajes de semillas poco desarrolladas tuvieron menores porcentajes de germinación (Cuadros 2, 3; Figura 1), lo que se confirmó al obtenerse una correlación significativa y positiva ($r = 0.69^*$, $P < 0.05$) entre el porcentaje de germinación y el porcentaje de semillas con estructuras completas. La velocidad de germinación y tiempo medio de germinación también varió entre especies (Cuadro 3).

La capacidad germinativa de las cuatro mejores especies de *Tillandsia* aquí registradas, en general concuerda con la reportado por otros autores en estudios efectuados en condiciones de laboratorio. Por ejemplo, Benzing (1978) encontró una variación 85 a 90 % en *T. paucifolia*. Castro-Hernández *et al.* (1999) obtuvieron valores más altos en *T. guatemalensis* (98 a 97.65 %) al igual que Mondragón y Calvo-Irabién (2006) en *T. brachycaulos* (100 %). De las seis especies evaluadas, *T. violacea* presentó los porcentajes más bajos (15.2 %), inferiores a los de Vadillo *et al.* (2004) en *Puya raimondii* (24.6 a 74.9 % en ambiente natural) y a los de Tarré *et al.* (2007) en *Encholirium scrutator* (45 %). Las diferencias de resultados entre este trabajo y los demás podría deberse a la condición silvestre de las poblaciones aquí evaluadas, y en el caso de *T. fasciculata* y *T. violacea* a las condiciones al momento de la colecta.

El paralelismo entre los resultados de la prueba de rayos X y los de la prueba de germinación sugiere que la capacidad




Figura 1. Porcentajes de germinación acumulada de semillas de seis especies de *Tillandsia*, en condiciones controladas (25 °C, >70% HR y fotoperiodo neutro).

Cuadro 3. Porcentajes de germinación total, velocidad de germinación y tiempo medio a 50 % de germinación (T50 %) de semillas de *Tillandsia*.

Especie	Germinación (% DE)	Velocidad de germinación	T50% (días)
<i>T. prodigiosa</i>	75.8 ± 5.1 b	9.8 c	4.8 a
<i>T. carlos-hankii</i>	79.5 ± 6.6 ab	11.8 bc	3.0 b
<i>T. bourgaei</i>	83.3 ± 5.8 a	11.2 c	3.0 b
<i>T. makoyana</i>	79.8 ± 9.1 ab	23.2 a	4.0 ab
<i>T. fasciculata</i>	45.0 ± 7.2 c	14.0 b	---
<i>T. violacea</i>	15.2 ± 1.8 d	4.0 d	---
Promedio	68.6	14.2	3.7
CV (%)	6.4	11.9	10.8
Valor de F	154.8**	85.9**	1.9**

Valores con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05); **Significativo ($P \leq 0.01$); DE = desviación estándar.

germinativa está determinada por la madurez del embrión y la presencia de cotiledón y de apéndices plumosos, entre otros aspectos relacionados con el desarrollo completo de las estructuras de la semilla. Las *Tillandsia* epífitas generalmente se desarrollan en condiciones de baja disponibilidad de agua y nutrientes, así como una reducida disponibilidad de polinizadores (Carranza-Quinceno y Estévez-Varón, 2008; Zotz y Asshoff, 2010; Zotz *et al.*, 2010), lo cual aumenta la probabilidad de que la semilla no alcance un desarrollo completo. La valoración rápida por rayos X es una opción viable para determinar indirectamente la capacidad germinativa y para decidir recolectar más semilla que satisfaga la calidad mínima requerida. Por ejemplo, para ingresar un lote de semillas a un banco de germoplasma se requiere un mínimo de 75 % de germinación (Engels y

Visser, 2003).

CONCLUSIONES

Hay diferencias significativas en la proporción de semillas sanas o con embriones parcialmente desarrollados así como en capacidad germinativa entre las seis especies de *Tillandsia*. *T. violacea* presentó los menores porcentajes de semillas sanas y mayores porcentajes de semillas con embriones parcialmente desarrollados, en comparación con *T. prodigiosa*, *T. carlos-hankii*, *T. bourgaei*, *T. makoyana* y *T. fasciculata*. En cuanto a su capacidad germinativa, *T. bourgaei* presentó el mayor porcentaje (83.3 %), seguida en orden descendente por *T. makoyana*, *T. carlos-hankii*, *T. prodigiosa*, *T. fasciculata* y *T. violacea* (15.16 %). El patrón de germinación se repitió en la tasa de germinación. Se

determinó una correlación positiva y significativa entre los porcentajes de semillas completas (análisis radiográfico) y la capacidad germinativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Benzing D H (1978)** Germination and early establishment of *Tillandsia circinata* Schlecht. (Bromeliaceae) on some of its hosts and other supports in Southern Florida. *Selbyana* 5:95-106.
- Carranza-Quiceno J A, J V Estévez-Varón (2008)** Ecología de la polinización de Bromeliaceae en el dosel de los bosques neotropicales de montaña. *Bol. Cient. Mus. Hist. Nat.* 12: 38-47.
- Castro-Hernández J C, J H D Wolf, J G García-Franco, M González-Espinosa (1999)** The influence of humidity, nutrients and light on the establishment of the epiphytic bromeliad *Tillandsia guatemalensis* in the highlands of Chiapas, Mexico. *Rev. Biol. Trop.* 47:763-773.
- Dos Santos S A, R F da Silva, M G Pereira, J C Machado, C F Machado, F M Borem, V M Gomes, O A O Tonetti (2009)** X-ray technique application in evaluating the quality of papaya seeds. *Seed Sci. Technol.* 37:776-780.
- Duarte E F, I F Carneiro, N F da Silva, N N R Guimarães (2010)** Características físicas e germinação de sementes de *Dyckia goehringii* Gross & Rauh (Bromeliaceae) sob diferentes temperaturas. *Pesq. Agrop. Trop.* 40:422-429.
- Engels, J M M, L Visser (eds) (2003)** A Guide to Effective Management of Germplasm Collections. IPGR Handbook for Genebanks No. 6. IPGR, Rome, Italy. 172 p.
- Espejo-Serna A, A R López, I Ramírez, B K Holst, H E Luther, W Till (2004)** Checklist of Mexican bromeliaceae with notes on species distribution and levels of endemism. *Selbyana* 25:33-86.
- Espejo-Serna A, A R López-Ferrari, N Martínez-Correa, V A Pulido-Esparza (2007)** Bromelias flora de Oaxaca, México: richness and distribution. *Acta Bot. Mex.* 81:71-147.
- Esteba F O (2002)** Bromelias para Aficionados. Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Comité de Bromeliología. Caracas, Venezuela. 230 p.
- Flores-Palacios A, S Valencia-Díaz (2007)** Local illegal trade reveals unknown diversity and involves a high species richness of wild vascular epiphytes. *Biol. Conserv.* 136: 372-387.
- García E (2004)** Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen. Serie Libros No. 6, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 90 p.
- Goode L K, M F Allen (2009)** Seed germination conditions and implications for establishment of an epiphyte, *Aechmea bracteata* (Bromeliaceae). *Plant Ecol.* 204:179-188.
- Hay F, R D Smith (2004)** Seed maturity: when to collect seed from wild plants. In: *Seed Conservation: Turning Science into Practice*. R D Smith, J B Dickie, S H Linington, H W Pritchard, R J Probert (eds). Royal Botanic Gardens Kew, UK. pp:99-133.
- Machado C F, S M Cícero (2003)** 'Aroeira-branca' (*Lithraea molleoides* (Vell.) Engl.-Anacardiaceae) seed quality evaluation by the X-ray test. *Sci. Agric.* 60:393-397.
- Mondragón D, L Calvo-Irabien (2006)** Seed dispersal and germination of *Tillandsia brachycaulos* an epiphytic plant in the Yucatán Peninsula. *South. Nat.* 51:462-470.
- Mondragón D, D Villa (2008)** Estudio etnobotánico de las bromelias epífitas en la comunidad de Sta. Catarina Ixtepeji. *Polibotánica* 26:175-191.
- Mondragón D (2009)** Aspectos etnobotánicos de la comercialización de bromelias epífitas en Oaxaca. *Rev. Etnobiol.* 6:24-28.
- Montes-Recinas S, J Márquez-Guzmán, A Orozco-Segovia (2012)** Temperature and water requirements for germination and effects of discontinuous hydration on germinated seed survival in *Tillandsia recurvata* L. *Plant Ecol.* 213:1069-1079.
- Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001) (2002)** Diario Oficial de la Federación. Estados Unidos Mexicanos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, D.F. 6 de marzo 2002.
- Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) (2010)** Diario Oficial de la Federación. Estados Unidos Mexicanos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, D.F. 15 de diciembre de 2010.
- Oliveira L M, M L M Carvalho, A C Davide (2003)** Utilização do teste de raios-X na avaliação da qualidade de sementes de *Canafistula Peltophorium dubium* (Sprengel) Taubert. *Rev. Brasil. Sementes* 25:116-120.
- Palací C A, G K Brown, D E Tuthill (2004)** The seed of *Catopsis* (Bromeliaceae: Tillandsioideae). *Syst. Bot.* 29:518-527.
- Pereira A R, A C S Andrade, T S Pereira, R C Forzza, A S Rodrigues (2009)** Comportamento germinativo de espécies epífitas e rupícolas de Bromeliaceae do Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. *Rev. Brasil. Bot.* 32:827-838.
- Pereira A R, A C S Andrade, T S Pereira, R C Forzza, A S Rodrigues (2010a)** Morphological aspects of seed, germination and storage of *Pitcairnia albiflos* (Bromeliaceae). *Seed Sci. Technol.* 38:79-87.
- Pereira C, F L Cuquel, M Panobianco (2010b)** Germinação e armazenamento de sementes de *Nidularium innocentii* (Lem.). *Rev. Brasil. Sementes* 32:36-41.
- Pinheiro F, F Borghetti (2003)** Light and temperature requirements for germination of seeds of *Aechmea nudicaulis* (L.) Griesbach and *Streptocalyx floribundas* (Martius ex Schultes F.) Mez (Bromeliaceae). *Acta Bot. Brasil.* 17:27-35.
- Pompelli M F, D Fernandes, M P Guerra (2006)** Germination of *Dyckia encholirioides* (Gaudichaud) Mez var. *encholirioides* under saline conditions. *Seed Sci. Technol.* 34:759-763.
- Ricker M, I Ramírez-Krauss, G Ibarra-Manríquez, E Martínez, C Ramos, G González-Medellín, G Gómez-Rodríguez, J L Palacio-Prieto, H M Hernández (2007)** Optimizing conservation of forest diversity: a country-wide approach in Mexico. *Biodivers. Conserv.* 16:1927-1957.
- Scatena V L, S Segecin, A I Coan (2006)** Seed morphology and post-seminal development of *Tillandsia* L. (Bromeliaceae) from the "Campus Gerais" Paraná, Southern Brazil. *Braz. Arch. Biol. Techn.* 49:945-951.
- Schmidt L H (2007)** Tropical Forest Seed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, USA. 410 p.
- Smith L B, R J Downs (1974)** Pitcarnioideae (Bromeliaceae). *Flora Neotrop.* 14:659-1492.
- Steel R G D, J H Torrie (1985)** Bioestadística: Principios y Procedimientos. McGraw-Hill Latinoamericana, S.A. Bogotá. Colombia. 622 p.
- Tarré E, B B M Pires, A P M Guimaraes, L A Carneiro, R C Forzza, E Mansur (2007)** Germinability after desiccation, storage and cryopreservation of seeds from endemic *Encholirium* Mart. Ex Schult. & Schult. F. and *Dyckia* Schult. & Schult. F. species (Bromeliaceae). *Acta Bot. Brasil.* 21:777-783.
- Vadillo G, M Suni, A Cano (2004)** Viabilidad y germinación de semillas de *Puya raimondii* Harms (Bromeliaceae). *Rev. Peruana Biol.* 11:71-78.
- Vieira B C, F A O Silveira (2010)** Reproductive phenology, seed germination and *ex situ* conservation of *Pseudananas sagenarius* in a semi-deciduous tropical forest fragment. *Plant Species Biol.* 25:214-220.
- Vieira D C M, F Socolowski, M Takaki (2007)** Germinação de sementes de *Dyckia tuberosa* (Vell.) Beer (Bromeliaceae) sob diferentes temperaturas em luz e escuro. *Rev. Brasil. Bot.* 30:183-188.
- Wester S, G Zotz (2011)** Seed comas of bromeliads promote germination and early seedling growth by wick-like water uptake. *J. Trop. Ecol.* 27:115-119.
- Zotz G, R Asshoff (2010)** Growth in epiphytic bromeliads: response to the relative supply of phosphorus and nitrogen. *Plant Biol.* 12:108-113.
- Zotz G, W Bogusch, P Hiezt, N Ketteler (2010)** Growth of epiphytic bromeliads in a changing world: the effects of CO₂, water and nutrient supply. *Acta Oecol.* 36:659-665.