

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE ALCALOIDES DE *Erythrina americana* MillerANTIOXIDANT ACTIVITY OF *Erythrina americana* Miller ALKALOIDS

Emmanuel Ibarra Estrada^{1*}, Maribel Pacheco Sánchez², Rosario García Mateos³, Rubén San Miguel Chávez⁴, Gustavo Ramírez Valverde⁵ y R. Marcos Soto Hernández⁴

¹Postgrado de Recursos Genéticos y Productividad-Fisiología Vegetal, ⁴Programa de Botánica y ⁵ Programa de Estadística, Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo, km. 36.5 Carr. México-Texcoco, 56280, Montecillo, Texcoco, Edo. de México. Tel: 01 (595) 95-20200 ext. 1361. ²Área de Biología y ³Área de Química, Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, km. 38.5 Carr. México-Texcoco, 56230, Chapingo, Texcoco, Edo. de México.

*Autor para correspondencia (bayor_8@hotmail.com)

RESUMEN

Los alcaloides son compuestos químicos que poseen propiedades farmacológicas a concentraciones bajas. En este estudio se evaluó la actividad antioxidante en fracciones de alcaloides libres hexánicos, libres metanólicos, liberados metanólicos y de erisodina, obtenidas de semillas de *Erythrina americana* Miller, mediante el método del radical estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH); dicha reacción se midió por espectroscopía UV-Visible. La fracción de alcaloides liberados presentó mayor actividad antioxidante ($0.1593 \text{ mg mL}^{-1} \pm 0.0305$), aunque las tres fracciones crudas inhibieron más de 50 % de la concentración del DPPH. Se aisló erisodina pura a partir de la fracción de alcaloides liberados por medio de cromatografía en columna con los eluyentes diclorometano:metanol en distintas polaridades; dicho alcaloide se identificó a través de cromatografía en capa fina y RMN-¹H. Erisodina causó una fuerte inhibición sobre el DPPH, comparable a la del ácido ascórbico ($\text{CI}_{50} = 0.0212 \text{ mg mL}^{-1} \pm 0.008$ y $\text{CI}_{50} = 0.0068 \text{ mg mL}^{-1} \pm 0.0008$, respectivamente). Erisodina a 0.5 mg mL^{-1} inhibió hasta 94 % del DPPH.

Palabras clave: *Erythrina americana*, antirradical, erisodina, alcaloides, radical libre.

SUMMARY

Alkaloids are chemical compounds with pharmacologic properties at low concentrations. In this study, the antioxidant activity of free alkaloids fractions in hexane and methanol, liberated in methanol and in erysodine, obtained from seeds of *Erythrina americana* Miller, was evaluated using the stable radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) method; the reaction was measured by UV-Visible spectroscopy. The liberated alkaloid fraction showed the highest antioxidant activity ($0.1593 \text{ mg mL}^{-1} \pm 0.0305$), though all three crude fractions inhibited more than 50 % of the DPPH concentration. Pure erysodine was isolated from the fraction of liberated alkaloids by column chromatography, using dichloromethane: methanol at different polarities; this alkaloid was identified by thin-layer chromatography and ¹H-NMR. Erysodine showed a strong DPPH inhibition which is comparable to the ascorbic acid inhibition ($\text{CI}_{50} = 0.0212 \text{ mg mL}^{-1} \pm 0.008$ and $\text{CI}_{50} = 0.0068 \text{ mg mL}^{-1} \pm 0.0007$, respectively). Also, erysodine at 0.5 mg mL^{-1} inhibited up to 94% of DPPH.

Index words: *Erythrina americana*, antiradical, erysodine, alkaloids,

free radical.

INTRODUCCIÓN

Erythrina americana, de la familia Leguminosae (Faba-ceae), ha sido estudiada por su alto contenido de alcaloides en semillas con su actividad farmacológica (García *et al.*, 2001). Esta especie contiene los alcaloides erisovina, erisodina, erisopina y α - y β -eritroidina (García *et al.*, 1996), los cuales son bases terciarias, mientras que otros alcaloides con similar actividad farmacológica son sales cuaternarias (Soto y Jackson, 1994). Tienen como base al esqueleto eritrinano, una espiroamina tetracíclica que se encuentra en dos formas en la planta: libre o conjugada formando glucósidos (García y Soto, 2001). En estudios con ratones y ranas, la erisodina administrada por vía oral, subcutánea, intraperitoneal e intralifántica presentó toxicidad en diferentes concentraciones (Garín *et al.*, 2001). Erisodina y la dihidro- β -eritroidina actuaron como antagonistas de los receptores nicotínicos $\alpha_4\beta_2$ y α_7 presentes en el hipocampo dorsal de ratas, y afectaron la consolidación de la memoria de corto plazo (Garín *et al.*, 2009).

En la búsqueda de compuestos naturales con actividad antioxidante se han encontrado diversos compuestos fenólicos, ácido ascórbico y compuestos nitrogenados como péptidos, aminoácidos, aminos y alcaloides (Valentao *et al.*, 2002). Los antioxidantes son sustancias sintéticas o naturales que se añaden a productos para prevenir o retardar el deterioro causado por acción del oxígeno del aire (Huang *et al.*, 2005). Los radicales libres inducen daño oxidativo a biomoléculas (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) y causan arterioesclerosis, envejecimiento, cáncer y otras enfermedades en humanos (Soler *et al.*, 2000; Bafna y Mishra, 2005). Estudios recientes sugieren

la existencia de seis especies reactivas de oxígeno (ROS) que provocan daño oxidativo al cuerpo humano: anión superóxido ($O_2^{\cdot-}$), peróxido de hidrógeno (H_2O_2), radicales peróxido (ROO^{\cdot}), radical hidroxilo (HO^{\cdot}), oxígeno (O_2) y peroxinitrito ($ONOO^{\cdot}$) (Huang *et al.*, 2005).

Un método sencillo, fácil y rápido de llevar a cabo, desarrollado por Brand-Williams *et al.* (1995) para determinar actividad antioxidante de alimentos y compuestos secundarios, utiliza al radical estable 2,2-difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH). En interacción con DPPH, los antioxidantes transfieren electrones o átomos de hidrógeno a este compuesto y así neutralizan su propiedad de radical libre (Naik *et al.*, 2003). La característica de la reacción es un efecto decolorante sobre el DPPH de azul-violeta a amarillo (Brand-Williams *et al.*, 1995). Una inhibición de por lo menos 50 % de la concentración de DPPH representa una buena actividad antioxidante. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la actividad antioxidante de fracciones crudas de alcaloides y de erisodina, y su comparación con ácido ascórbico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal

Se trabajó con 388 g de *E. americana* Miller recolectada en los jardines de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, en octubre de 2008.

Preparación de los extractos crudos de alcaloides

Se siguieron los métodos descritos por Games *et al.* (1974) que a continuación se detallan:

Alcaloides libres. Las semillas trituradas mecánicamente (388 g) se desengrasaron con hexano por 48 h, en un soxhlet; el disolvente se evaporó al vacío y el extracto crudo hexánico se lavó con una solución de H_2SO_4 a 2 %. La separación de la grasa se llevó a cabo con lavados consecutivos de diclorometano (3 lavados de 100 mL cada uno). La fase acuosa se basificó con $NaHCO_3$ hasta alcanzar un pH entre 8 y 9, seguida de una extracción con diclorometano (5 extracciones de 100 mL cada una). El extracto de diclorometano se secó con Na_2SO_4 anhidro y se evaporó a presión reducida para obtener la fracción de alcaloides libres del extracto hexánico. Las semillas se secaron a temperatura ambiente y se extrajeron con metanol en un soxhlet durante 72 h, y el disolvente se evaporó a sequedad. El extracto crudo se disolvió en una solución de H_2SO_4 1 M; después se hicieron lavados con diclorometano (5 lavados de 100 mL cada uno). El disolvente libre de humedad se evaporó para obtener la fracción de alcaloides libres.

Alcaloides liberados. El remanente de la fase acuosa se acidificó a pH 2 con ácido clorhídrico concentrado. La mezcla se llevó a reflujo durante 3 h a una temperatura entre 60 y 70 °C. La mezcla fría se alcalinizó con $NaHCO_3$ hasta obtener pH 8 y se extrajo con diclorometano (5 extracciones de 100 mL cada una); el disolvente se secó con Na_2SO_4 anhidro y posteriormente se evaporó, para obtener la fracción de alcaloides liberados.

Purificación de alcaloides. De la fracción de alcaloides liberados se obtuvo el alcaloide erisodina mediante fraccionamiento por cromatografía preparativa en columna, con sílica gel (gel de sílice G 60 Merck) como fase estacionaria; los eluyentes fueron diclorometano:metanol en diferentes proporciones, desde 100:0 % a 80:20 % (v:v). Se obtuvieron fracciones de 5 mL cada una y se analizaron por cromatografía en capa fina, y se combinaron las que resultaron cromatográficamente similares. Después se realizó otra columna preparativa para la separación de los isómeros erisovina y erisodina, con el uso de los eluyentes cloroformo:metanol desde 100:0 % hasta 95:5 %.

Análisis por RMN- 1H . La resonancia magnética nuclear es un método espectral basado en las propiedades magnéticas de los núcleos y, en su aplicación más común, en las propiedades del núcleo de hidrógeno. El compuesto obtenido de la cromatografía en columna se analizó por RMN- 1H . Los espectros se determinaron en un espectrofotómetro Bruker-360® de 360 MHz (Bruker Daltonic GmbH Bremen Alemania), con DMSO (dimetilsulfóxido) como disolvente y TMS (tetrametilsilano) como referencia interna. Los desplazamientos químicos se expresan en unidades delta (δ).

Determinación de actividad antioxidante. La actividad antioxidante se evaluó mediante el método del radical libre DPPH, como lo describen Liu *et al.* (2009) y Kubola y Siriamornpun (2008). Dicho radical tiene un electrón no apareado (libre) y presenta un color azul-violeta que cambia a amarillo pálido en presencia de una sustancia antioxidante; esta reacción se midió en un espectrofotómetro marca Pye Unicam® SP 8-100 a 517 nm. Se preparó una solución metanólica de DPPH 0.1 mM. La absorbancia inicial del DPPH en metanol se midió a 517 nm, y no se registraron cambios durante el ensayo con las muestras. Se construyó una curva patrón a partir de la medición de la absorbancia del radical DPPH a diferentes concentraciones DPPH (0.1, 0.08, 0.06, 0.04, 0.02, 0.01 y 0 mM). Después, una alícuota de 1 mL de cada tratamiento (en diferentes concentraciones utilizadas) se agregó a 3 mL de solución metanólica de DPPH. La reacción se midió a 517 nm después de una incubación por 30 min a 30 °C en oscuridad. A partir de la ecuación de la curva se determinó la concentración a la cual se redujo el DPPH. Las mediciones se llevaron a cabo por

triplicado. El porcentaje de DPPH inhibido (% DPPH) se calculó con la ecuación:

$$\% \text{ DPPH}_{\text{inhibido}} = (A_{\text{control}} - A_{\text{muestra}}) \times 100 / A_{\text{control}}$$

donde A_{control} es la absorbancia del control, y A_{muestra} es la absorbancia de la muestra. Los valores de CI_{50} se calcularon a partir de gráficos del porcentaje de inhibición y las concentraciones de los tratamientos. El CI_{50} denota la concentración de un compuesto para inhibir la concentración del valor inicial del DPPH a 50 %, a una absorbancia de 517 nm.

Diseño experimental

Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco tratamientos a diferentes concentraciones: fracción de alcaloides libres hexánicos, fracción de alcaloides libres metanólicos, fracción de alcaloides liberados, erisodina y ácido ascórbico (testigo positivo). Se utilizaron las concentraciones 0.5, 0.1 y 0.05 mg mL⁻¹ para las fracciones crudas; 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 y 0.05 mg mL⁻¹ para erisodina; y 0.001, 0.005, 0.0075 y 0.01 mg mL⁻¹ para ácido ascórbico. Las evaluaciones se hicieron por triplicado.

Para determinar diferencias entre tratamientos se hizo un análisis de varianza con el paquete SAS para Windows 9.0, previa transformación a rangos (Conover y Iman, 1981) para el cumplimiento de los supuestos, así como la comparación de medias REGWQ (Ryan-Einot-Gabriel-Welsh).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudio fitoquímico

Se obtuvieron 57.2 g de extracto crudo hexánico y 102.4 g de extracto crudo metanólico. En el Cuadro 1 se presenta la cantidad de fracciones crudas obtenidas a partir de los extractos crudos de semillas de *E. americana*.

Cuadro 1. Cantidad y rendimiento de fracciones crudas de alcaloides

Fracción cruda de alcaloides	Peso (g)	Rendimiento con respecto al peso de las semillas (%)
Libres hexánicos	0.026	0.006
Libres metanólicos	6.5424	1.68
Liberados	1.4418	0.37

Para *E. americana*, Sotelo *et al.* (1993) reportaron 0.13 % de fracción de alcaloides liberados y 0.4 % de alcaloides libres. En el presente estudio se encontró un rendimiento superior con respecto a la cantidad de muestra utilizada.

Garín *et al.* (2000) reportaron un rendimiento de 0.224 % de fracción de alcaloides liberados de semillas de *E. americana*, valor que corresponde con el obtenido en este estudio. La fracción de alcaloides liberados se purificó en una columna cromatográfica, y se obtuvieron 34.9 mg de un compuesto con aspecto de polvo café y amorfo con un punto de fusión de 204-206 °C, correspondiente a la erisodina (Amer, 1991). Se hizo un segundo análisis cromatográfico a 34.9 mg del compuesto obtenido en el primer análisis, para separar la erisodina de su isómero erisovina, y así lograr una mejor purificación. En el Cuadro 2 se presentan los desplazamientos químicos de los protones de erisodina en RMN-¹H.

Cuadro 2. Desplazamientos químicos de erisodina

Protones	Desplazamientos químicos (δ)
1H	6.04
2H	6.58
3Ha	4.01
4Ha	1.6
4He	2.5
7H	5.73
8H	3.38
8H	3.58
10Ha	2.93
10He	3.39
11Ha	2.89
11He	2.35
14H	6.77
17H	6.72
15OCH3	3.77
3OCH3	3.31

Actividad antioxidante

En el Cuadro 3 se presentan las concentraciones inhibitorias 50 (CI_{50}) de fracciones crudas de alcaloides, de erisodina y del ácido ascórbico.

Erisodina provocó produjo una alta inhibición sobre DPPH, con una CI_{50} de 0.0211 mg mL⁻¹, comparable con la del ácido ascórbico (0.0068 mg mL⁻¹). Ambos compuestos mostraron potente actividad inhibitoria sobre el radical estable DPPH. La CI_{50} de la erisodina en este estudio es más efectiva que la obtenida para este mismo compuesto pero extraído de *E. lysistemon*, en el cual erisodina tuvo una CI_{50} de 150 µg mL⁻¹ después de 30 min de reacción, y de 90 µg mL⁻¹ después de 4 h. Así mismo, (+)-11α-hidroxiserisodina dio una CI_{50} de 200 µg mL⁻¹ a los 30 min de reacción, y de 170 µg mL⁻¹ a las 4 h, sobre DPPH 0.5 mM (Juma y Majinda,

Cuadro 3. Porcentajes de inhibición y CI_{50} de los tratamientos en su actividad sobre DPPH.

Extracto o compuesto	Concentración (mg mL ⁻¹)	Inhibición del radical DPPH (%)	$CI_{50} \pm DE$ (mg mL ⁻¹)
Ácido ascórbico	0.001	26.20 \pm 2.999	0.0068 a \pm 0.0008
	0.005	46.09 \pm 2.129	
	0.0075	51.66 \pm 1.502	
	0.01	56.44 \pm 2.375	
Erisodina	0.05	54.91 \pm 1.431	0.0212 a \pm 0.0080
	0.1	77.19 \pm 2.946	
	0.2	88.61 \pm 2.814	
	0.3	90.38 \pm 2.951	
	0.4	91.67 \pm 3.969	
	0.5	94.23 \pm 3.312	
Fracción de alcaloides liberados	0.05	35.09 \pm 3.487	0.1593 b \pm 0.0305
	0.5	74.41 \pm 3.810	
	1	82.19 \pm 1.661	
Fracción de alcaloides libres hexánicos	0.05	39.68 \pm 7.190	0.1719 b \pm 0.0960
	0.5	57.28 \pm 2.834	
	1	75.30 \pm 1.756	
Fracción de alcaloides libres metanólicos	0.05	30.61 \pm 1.397	0.7243 c \pm 0.1991
	0.5	48.31 \pm 2.394	
	1	52.84 \pm 4.006	

DE = Desviación estándar. Los valores de porcentajes de inhibición se presentan como medias. Los valores de CI_{50} se presentan como medias \pm desviación estándar. medias de CI_{50} con letras iguales no son significativamente diferentes (REGWQ, 0.05).

2004). La concentración de DPPH utilizada podría explicar la diferencia entre concentraciones inhibitorias. El alcaloide melosmina de *Rollinia pittieri* presentó una CI_{50} de $3.037 \pm 0.18 \mu\text{g mL}^{-1}$ (Montoya *et al.*, 2004), valor superior al obtenido con erisodina, que a su vez es superior a O-metil-moschatolina de la misma especie y que no mostró efecto significativo sobre DPPH. La melosmina tiene dos grupos hidroxilos, que pueden ser responsables de la donación de átomos de hidrógeno necesarios para la actividad antioxidante, mientras que erisodina presenta un grupo hidroxilo en su estructura; la ausencia de estos grupos en O-metil-moschatolina podría explicar su pobre actividad.

Entre fracciones crudas, la de alcaloides liberados presentó la mejor concentración para inhibir al radical DPPH ($0.1593 \text{ mg mL}^{-1}$) y es significativamente igual a la que presentó la fracción de alcaloides libres hexánicos ($0.1791 \text{ mg mL}^{-1}$). La fracción de alcaloides libres metanólicos presentó una CI_{50} de $0.7243 \text{ mg mL}^{-1}$, que es menos efectiva para inhibir al menos en 50 % a la concentración original del DPPH.

En *E. latissima*, Chacha *et al.* (2005) estudiaron las propiedades antioxidantes de flavonoides de madera del tallo de esta especie, un pterocarpano ($135 \mu\text{g mL}^{-1}$), una

chalcona ($160 \mu\text{g mL}^{-1}$) y una flavanona ($380 \mu\text{g mL}^{-1}$), las cuales presentaron menor actividad antirradical que erisodina.

Entre los porcentajes de inhibición de las fracciones crudas y el ácido ascórbico se aprecia que los alcaloides libres hexánicos y liberados presentan altos porcentajes de inhibición sobre el radical DPPH; sin embargo, las concentraciones de las fracciones crudas son mayores que las utilizadas con ácido ascórbico (Cuadro 3). Con las tres fracciones crudas evaluadas se logró una inhibición de por lo menos 50 % sobre el radical estable, aunque su potencial es diferente; esto evidencia que las fracciones crudas tienen propiedades antioxidantes, debido quizá a un efecto sinérgico entre los alcaloides presentes, pero su efecto es inferior al del ácido ascórbico. Similar al efecto de las fracciones crudas de alcaloides de *E. americana*, los extractos de diferentes especies como el extracto de oleorresina de hojas del árbol del curry (*Murraya koenigii* Spreng.) (Rao *et al.*, 2007) y la fracción alcaloidal del extracto metanólico de raíces de *Cissampelos pareria* Linn. (Bafna y Mishra, 2010), presentaron más de 50 % de inhibición sobre el DPPH.

En el Cuadro 3 se aprecia que erisodina en la mínima

concentración evaluada, logró inhibir más de 50 % del DPPH. En concentraciones mayores alcanzó porcentajes de inhibición muy altos; con 0.5 mg mL⁻¹ inhibió hasta 94.23 % \pm 1.4 de la concentración de DPPH, comparable con el alcaloide pterodina de tipo oxindol aislado de uña de gato (*Uncaria tomentosa*), el cual presentó una inhibición de 98.26 % con una concentración de 250 μ g mL⁻¹ (Paniagua *et al.*, 2009); erisodina a esta misma concentración inhibe alrededor de 90 % del radical DPPH.

A una concentración de 100 μ g mL⁻¹ los alcaloides 6-acetonildihidroqueleritrina, queleritrina y dihidroqueleritrina, aislados del extracto de metanol de la corteza de *Bocconia arborea*, presentaron un porcentaje de barrido sobre DPPH de 84.3, 80.2 y 77.5 % respectivamente (Pérez *et al.*, 2003) valores similares a los presentados por erisodina a esa concentración con 77.19 %. Este último valor es ligeramente superior al que presentó el alcaloide norditerpeno cochlearenina obtenido de raíces de *Delphinium linearilobum*, que tuvo un efecto inhibitorio de 75.52 % sobre el radical DPPH a una concentración de 100 μ g, ligeramente inferior al presentado por erisodina a la misma concentración (77.19 % \pm 3.9) (Kolak *et al.*, 2006); el alcaloide koenigina extraído de hojas del árbol del curry inhibió 91.6 % a 50 μ g g⁻¹ (Rao *et al.*, 2007). Estos alcaloides con efecto inhibitorio sobre DPPH contienen grupos hidroxilo, al igual que la erisodina; esto parece indicar que la actividad secuestradora sobre el radical se debe a la habilidad para donar átomos de hidrógeno. Los resultados de este estudio sugieren que la eficiente habilidad de erisodina para atrapar al radical DPPH podría relacionarse con la capacidad para inhibir daños al ADN, como se demostró para el alcaloide pterodina (Paniagua *et al.*, 2009).

CONCLUSIONES

Las fracciones crudas de alcaloides de *E. americana* tienen potencial antioxidante con diversos niveles de poder inhibitorio sobre el DPPH, donde destaca la fracción de alcaloides liberados con la mayor actividad antioxidante. El alcaloide diénico erisodina tiene un potencial antioxidante similar al del ácido ascórbico. El método DPPH es sencillo y rápido para evaluar la actividad antioxidante de compuestos bioactivos, principalmente con los que contienen grupos -OH, tal como erisodina. Este estudio contribuye al conocimiento de la actividad antioxidante de los alcaloides del tipo eritranano, en particular del alcaloide erisodina.

BIBLIOGRAFÍA

- Amer M E (1991) The tetracyclic *Erythrina* alkaloids. J. Nat. Prod. 54:329-363.
- Bafna A R, S H Mishra (2005) Actividad antioxidante *in vitro* del extracto de metanol de los rizomas de *Curculigo orchoides* Gaertn. Ars Pharm. 46:125-38.
- Bafna A R, S H Mishra (2010) Antioxidant and immunomodulatory activity of the alkaloidal fraction of *Cissampelos pareira* Linn. Sci. Pharm. 78:21-31.
- Brand-Williams W, M E Cuvelier, C Berset (1995) Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensm. Wiss. Technol. 28:25-30.
- Chacha M G, Bojase M, R R T Majinda (2005) Antimicrobial and radical scavenging flavonoids from the stem wood of *Erythrina latissima*. Phytochemistry 66:99-104.
- Conover W J, R L Iman (1981) Rank transformations as a bridge between parametric and nonparametric statistics. The Amer. Stat. 35:124-129.
- Games D E, A H Jackson, N A Khan, O S Millington (1974) Alkaloids of some African, Asian, Polynesian and Australian species of *Erythrina*. Lloydia 37:581-588.
- García M R, M Soto H (2001) Alcaloides como una alternativa en la obtención de principios activos. Prod. Nat. Persp. Biotecnol. 6:1-9.
- García M R, B Lucas, M Zendejas, M Soto H, M Martínez, A Sotelo (1996) Variation of total nitrogen, non-protein nitrogen content, and types of alkaloids at different stages of development in *Erythrina americana* seeds. J. Agric. Food Chem. 44:2987-2991.
- García M R, M Soto H, H Vibrans (2001) *Erythrina americana* Miller ("Colorín"; Fabaceae), a versatile resource from Mexico: a review. Econ. Bot. 55:391-400.
- Garín A M E, J E Ramírez L, M Soto H, G Valencia del T, M Martínez V (2000) Effect of crude extracts of *Erythrina americana* Mill. on aggressive behavior in rats. J. Ethnopharm. 69: 189-196.
- Garín A M E, G Valencia del T, S G Sánchez H, M Soto H, J García A (2001) Alcaloides de *Erythrina herbacea*. Prod. Nat. Persp. Biotecnol. 6:10-19.
- Garín A M E, S López V, C L Martínez V, G Valencia del T, M Soto H, R A Prado A (2009) Erisodina y receptores nicotínicos $\alpha 4\beta 2$ del hipocampo dorsal en la consolidación de la memoria. Rev. Latinoam. Quím. 37:206-217.
- Huang D, B Ou, R L Prior (2005) The chemistry behind antioxidant capacity assays. J. Agric. Food Chem. 53:1841-1856.
- Juma B F, R R T Majinda (2004) Erythraline alkaloids from the flowers and pods of *Erythrina lysistemon* and their DPPH radical scavenging properties. Phytochemistry 65:1397-1404.
- Kolak U, M Öztürk, F Özgökçe, A Ulubelen (2006) Norditerpene alkaloids from *Delphinium linearilobum* and antioxidant activity. Phytochemistry 67:2170-2175.
- Kubola J, S Siriamornpun (2008) Phenolic contents and antioxidant activities of bitter melon (*Momordica charantia* L.) leaf, stem and fruit fraction extracts *in vitro*. Food Chem. 110:881-890.
- Liu L, Y Sun, T Laura, X Liang, H Ye, X Zeng (2009) Determination of polyphenolic content and antioxidant activity of kudingcha made from *Ilex kudingcha* C. J. Tseng. Food Chem. 112:35-41.
- Montoya P G L, E J Osorio D, N S Jiménez U, G J Arango A (2004) Actividad captadora de radicales libres de alcaloides de *Rollinia pittieri* (Annonaceae) por el método del DPPH. Rev. Fac. Quím. Farm. Univ. Antioquia 11:51-57.
- Naik G H, K I Priyadarsini, J G Satav, M M Banavalikar, D P Sohoni, M K Biyani, H Mohan (2003) Comparative antioxidant activity of individual herbal components used in Ayurvedic medicine. Phytochemistry 63:97-104.
- Paniagua P R, E Madrigal B, D Molina J, S Reyes C, I Álvarez G, L Sánchez C, J Pérez G (2009) Antigenotoxic, antioxidant and lymphocyte induction effects produced by pterodine. Basic Clinical Pharmacol. Toxicol. 104:222-227.
- Pérez R M, R Vargas, F J Martínez, E V García, B Hernández (2003) Actividad antioxidante de los alcaloides de *Bocconia arborea*. Estudio sobre seis métodos de análisis. Ars Pharm. 44:5-21.
- Rao L J M, K Ramalaksmi, B B Borse, B Raghavan (2007) Antioxidant and radical-scavenging carbazole alkaloids from the oleoresin of curry leaf (*Murraya koenigii* Spreng.). Food Chem. 100:742-747.
- Soler R C, J C Espín, H J Wichers (2000) An easy and fast test to compare total free radical scavenger capacity of foodstuffs. Phytochem.

Anal. 11:330-338.

Sotelo A, M Soto, B Lucas, F Giral (1993) Comparative studies of the alkaloidal composition of two Mexican species and nutritive value of the detoxified seeds. J. Agric. Food Chem. 41:2340-2343.

Soto H M, A H Jackson (1994) *Erythrina* alkaloids: isolation and characterization of alkaloids from seven *Erythrina* species. Planta Med. 60:175-177.

Valentao P, E Fernández, F Carvalho, P B Andrade, R M Seabra, M L Bastos (2002) Antioxidative properties of cardoon (*Cynara cardunculus* L.) infusion against superoxide radical, hydroxyl radical, and hypochlorous acid. J. Agric. Food Chem. 50:4989-4993.