

## POTENCIAL AGRONÓMICO DE VARIEDADES CRIOLLAS DE MAÍZ CACAHUACINTLE EN EL VALLE DE TOLUCA

## AGRONOMIC POTENTIAL OF CACAHUACINTLE MAIZE LANDRACES AT TOLUCA VALLEY

José L. Arellano Vázquez<sup>1\*</sup>, A. Josué Gámez  
Vázquez<sup>2</sup> y Miguel A. Ávila Perches<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Programa de Maíz, Campo Experimental Valle de México, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Km 18.5 carretera Los Reyes-Lechería. 56230, Chapingo, Estado de México, México. Tel. 01(595)95-42877. <sup>2</sup>Programa de Maíz, Campo Experimental Celaya. Km 6.5 carretera Celaya-San Miguel de Allende. 30018, Celaya, Guanajuato, México. Tel. 01(461)617-7107.

\* Autor para correspondencia (arellano.jose@inifap.gob.mx)

### RESUMEN

La producción de maíz Cacahuacintle (*Zea mays* L.) del Valle de Toluca se comercializa principalmente como elote y grano para pozole, a un precio de 75 a 300 % por arriba del precio del maíz blanco. La producción de maíz Cacahuacintle en la región depende de las variedades criollas. En este estudio se evaluaron bajo condiciones de secano, 42 variedades criollas de maíz Cacahuacintle, y los híbridos comerciales ‘H-33’, ‘H-44’ y ‘H-137’, en experimentos establecidos en Calimaya y Metepec, ambas en El Valle de Toluca, Estado de México. Se utilizó el diseño experimental bloques completos al azar con tres repeticiones. Entre localidades se detectaron diferencias ( $P \leq 0.01$ ) para altura de planta y de mazorca, número de mazorcas por planta y rendimiento de grano. Entre variedades hubo diferencias ( $P \leq 0.01$ ) para días a floración femenina, mazorcas por planta, acame y rendimiento. Las variedades llegaron a floración femenina entre 99 y 106 d después de la siembra, con un nivel de acame de 12 a 24 %, y se caracterizaron como variedades tardías con acame de moderado a alto. El rendimiento de las mejores variedades criollas varió de 7.5 a 8.9 t ha<sup>-1</sup> y las variedades 7, 11 y 32 destacaron por sus altos valores de rendimiento, peso hectolítrico y peso de 100 semillas.

**Palabras clave:** *Zea mays*, grano harinoso, rendimiento, días a floración, tamaño del grano.

### SUMMARY

The Cacahuacintle maize (*Zea mays* L.) production in the Toluca Valley is marketed as “elote” (green and fresh ear) and as grain for “pozole”, at prices 75 to 300 % higher than common white grain.

Cacahuacintle maize production in the region depends on native maize landraces. In this study we evaluated 42 Cacahuacintle maize landraces and the hybrids ‘H-33’, ‘H-44’ and ‘H-137’, in experiments established under rainfed conditions in Calimaya and Metepec, both in Toluca Valley, State of México. A randomized complete block design with three replications was used. Significant differences ( $P \leq 0.01$ ) were detected between localities for plant height, ear height, ears per plant and grain yield. Among landraces there were differences ( $P \leq 0.01$ ) for days to silking, ears per plant, lodging percent and grain yield. Days to silking ranged from 99 to 106 d after sowing, and lodging from 12 to 24 %. These landraces were thus classified as late season varieties, with moderate to high lodging. Grain yield in the best performing landraces ranged from 7.5 to 8.9 t ha<sup>-1</sup>, while varieties 7, 11 and 32 stood out for their high values of grain yield, hectolitic weight and weight of 100 seeds.

**Index words:** *Zea mays*, floury grain, grain yield, silking, grain size.

### INTRODUCCIÓN

En México el maíz Cacahuacintle (*Zea mays* L.) se cultiva en los Valles Altos de la Mesa Central, en donde las áreas más importantes de producción comercial se localizan en el Valle de Toluca del Estado de México. En esa región se siembran 20 000 ha para la producción de elote y 10 500 ha para grano para consumo en pozole, un platillo popular en el país (González *et al.*, 2006). Al menos 80 % de la producción de maíz Cacahuacintle del Estado de México se comercializa en la Central de Abastos del Distrito Federal, como elote y grano para pozole, a un precio que supera entre 75 y 300 % al precio del maíz blanco común. La producción de maíz Cacahuacintle se hace con variedades criollas nativas de la región, entre las cuales es posible identificar variedades con potencial agronómico para mejorar la productividad de este tipo de maíz.

Los objetivos del presente estudio fueron: 1) Determinar el rendimiento de grano y la expresión de caracteres de planta, mazorca y grano en variedades criollas de maíz Cacahuacintle; 2) Establecer las relaciones entre los caracteres agronómicos a través del análisis estadístico de componentes principales; y 3) Seleccionar variedades sobresalientes en función del rendimiento y caracteres de planta y grano.

### MATERIALES Y MÉTODOS

**Material genético.** Se utilizaron 41 variedades criollas de maíz Cacahuacintle, de las cuales 25 fueron colectadas de manera directa con productores en varias regiones del Municipio de Chalchicomula, Estado de Puebla, ubicadas en altitudes de 2600 a 2900 m; las otras 16 variedades fueron colectadas en los Municipios de Calimaya, Toluca, Metepec y Tenango del Valle también del Estado de México, con altitudes similares a las localidades del Estado de Puebla. Como variedades testigo se incluyeron

las siguientes: la Población 89 de maíz harinoso, obtenida por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), compuesta en 90 % por germoplasma de la raza Cacahuacintle proveniente de los Valles Altos Mexicanos y Andinos (CIMMYT, 2001); y a los híbridos de maíz de endospermo dentado y textura semicristalina ‘H-33’, ‘H-44’ y ‘H-137’ obtenidos por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y que son recomendados para su siembra en áreas de temporal (o seco) o riego de los Valles Altos de la Mesa Central (Albarrán *et al.*, 1990).

**Localidades, fechas de siembra y manejo agronómico.** Los experimentos se establecieron en dos localidades del Estado de México: Calimaya, ubicada a 19° 17’ LN, 99° 39’ LO, altitud de 2675 m, temperatura media de 12.7 °C, precipitación pluvial media de 850 mm y tipo de clima C(w2)(w)big; y Metepec, ubicada a 19° 13’ LN, 99° 35’ LO, altitud de 2606 m, temperatura media de 13.4 °C, precipitación pluvial de 890 mm y tipo de clima C(w2)(w)big (García, 1973). Los experimentos se desarrollaron bajo condiciones de temporal o seco, y las siembras se llevaron a cabo los días 10 y 24 de abril del 2005 en Calimaya y Metepec, respectivamente. La fertilización se hizo con la fórmula 120N-60P-30K y la densidad de población fue de 63 500 plantas ha<sup>-1</sup> (Albarrán *et al.*, 1990).

**Diseño experimental, datos registrados y análisis estadístico.** Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones, en el que el tamaño de parcela fue dos surcos de 6.0 x 0.8 m. Los datos registrados fueron: días a floración masculina (FLORM); días a floración femenina (FLORF); altura de planta, en cm (ALTPL); altura de mazorca, en cm (ALTMZ); acame de planta, en porcentaje (ACAME); número de mazorcas por planta (MAZPL); rendimiento de grano, en t ha<sup>-1</sup> (REND); peso hectolítrico, en kg hL<sup>-1</sup> (PHEC); y peso de 100 semillas, en g (P100S). Con esos datos se efectuaron análisis combinados de varianza y la prueba de Tukey al 0.05 de probabilidad del error para la comparación de medias. Además se efectuó un análisis de

componentes principales. Los análisis de varianza, prueba de medias y de componentes principales se llevaron a cabo con los procedimientos indicados en SAS/STAT User’s Guide (SAS Institute, 1996).

**RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

Se detectaron diferencias significativas (P ≤ 0.01) entre localidades para los caracteres: altura de mazorca, grado de acame, número de mazorcas por planta y rendimiento (Cuadro 1). Entre variedades hubo diferencias significativas (P ≤ 0.01) para días a floración masculina y femenina, grado de acame, número de mazorcas por planta, rendimiento, peso hectolítrico del grano y peso de 100 semillas, lo cual evidencia la variabilidad genética para esos caracteres. En la interacción variedades x localidades hubo diferencias (P ≤ 0.01) para acame y rendimiento.

**Comparación de localidades y variedades**

En Calimaya el rendimiento fue superior (P ≤ 0.01) en 1.2 t ha<sup>-1</sup>, respecto al obtenido en Metepec. Entre las variedades criollas de maíz Cacahuacintle, se detectó que 20 de ellas rindieron entre 7.5 y 8.9 t ha<sup>-1</sup>, lo cual representa un alto potencial de rendimiento si se considera que éstas no han sido mejoradas genéticamente, y además fueron similares al testigo ‘H-44’ que es un híbrido triple de grano semicristalino que rindió 10.3 t ha<sup>-1</sup>. Las variedades llegaron a floración femenina entre los 99 y los 106 d, con alturas de planta que fluctuaron de 250 a 280 cm y con nivel de acame de 12 a 24 %; es decir, son variedades tardías con porte de planta muy alto y nivel de acame de moderado a alto.

En el grupo de variedades de mayor rendimiento se ubicaron tres variedades del Estado de México (32, 27, y 15) que rindieron 8.9, 8.5 y 8.4 t ha<sup>-1</sup> respectivamente; estas variedades son originarias de Santa María Nativitas, Tenango del Valle y Metepec, áreas reconocidas por su alta productividad de maíz Cacahuacintle.

**Cuadro 1. Cuadrados medios y significancia estadística de caracteres de planta y grano en variedades de maíz Cacahuacintle evaluadas en Calimaya y Metepec del Estado de México, 2005.**

Fuente de variación	gl	FLORM (d)	FLORF (d)	ALTPL (cm)	ALTMZ (cm)	ACAME (%)	MAZPL	REND (t ha <sup>-1</sup> )	PHEC (kg hL <sup>-1</sup> )	P100S (g)
Localidades (L)	1	0.000614	0.00043	15895	108136**	10067**	2.6**	87423180**	1.0	1.2
Repeticiones (Loc)	4	5.85	3.26	247	428	41**	0.24**	5504879**	19.5*	57.2**
Variedades (v)	44	24.97**	24.87**	384	419	16*	0.08**	4768740**	65.6**	129.4**
V x L	44	0.058	0.016	471	553	17*	0.03	2458863**	1.15	1.17
Error total	176									
CV (%)		2.7	2.6	6.0	12.4	38.7	17.3	16.0	1.7	1.9

\*\* = Diferencias significativas (P < 0.01) FLORM = floración masculina; FLORF = floración femenina; ALTPL = altura de planta; ALTMZ = altura de mazorca; ACAME = acame de planta; MAZPL = mazorcas por planta; REND = rendimiento; PHEC = peso hectolítrico del grano; P100S = peso de 100 semillas

**Cuadro 2. Promedios de caracteres de planta, mazorca, grano y rendimiento, de variedades de maíz Cacahuacintle, en Calimaya y Metepec del Estado de México, 2005.**

Variedades	FLORF (días)	ALTPL (cm)	ACAME (%)	MAZPL	REND (t ha <sup>-1</sup> )	PHEC (kg hL <sup>-1</sup> )	P100S (g)
44	105 a	250 c	12 d	1.28 a	10.3 a	74 a	33 e
32	101 b	270 a	16 c	0.95 b	8.9 a	64 b	64 a
27	102 b	260 b	19 b	0.89 b	8.5 a	59 b	60 b
15	103 a	272 a	16 c	0.95 b	8.4 a	62 b	58 b
11	102 b	274 a	15 c	0.87 b	8.3 a	62 b	58 b
7	103 a	276 a	18 b	0.85 b	8.3 a	61 b	63 a
25	104 a	269 a	17 b	0.88 b	8.2 a	58 b	57 b
12	101 b	269 a	13 d	0.85 b	8.1 a	59 b	57 b
28	103 a	264 b	17 b	0.87 b	7.9 a	58 b	53 b
3	99 c	275 a	15 c	0.86 b	7.9 a	62 b	56 b
4	102 b	269 a	16 c	0.81 b	7.8 a	61 b	53 b
22	100 b	266 b	19 b	0.95 b	7.8 a	60 b	56 b
33	102 b	273 a	17 b	0.86 b	7.8 a	61 b	66 a
38	104 a	260 b	16 c	0.95 b	7.7 a	64 b	54 b
13	106 a	280 a	17 b	0.87 b	7.7 a	64 b	56 b
26	101 b	257 b	18 b	0.95 b	7.6 a	66 b	49 d
9	103 a	262 b	19 b	0.88 b	7.5 a	60 b	67 a
2	103 a	275 a	19 b	0.87 b	7.5 a	63 b	49 d
1	103 a	279 a	15 c	0.88 b	7.5 a	62 b	55 c
21	101 b	275 a	19 b	0.84 b	7.5 a	61 b	58 c
41	104 a	261 b	10 d	0.88 b	7.5 a	61 b	55 c
34	104 a	284 a	23 a	0.85 b	7.4 b	60 b	64 a
29	103 a	276 a	12 d	0.81 b	7.3 b	58 b	57 b
36	106 a	284 a	19 b	0.63 c	7.2 b	64 b	64 a
42	101 b	266 b	18 b	0.98 a	7.1 b	65 b	49 d
37	105 a	259 b	16 c	0.89 b	7.1 b	58 b	64 a
6	102 b	265 b	18 b	0.89 b	7.0 b	60 b	60 a
43	105 a	258 b	17 b	1.16 a	7.0 b	70 b	33 e
39	103 a	264 b	11 d	0.93 b	6.9 b	61 b	57 c
20	102 b	281 a	23 a	0.77 b	6.9 b	59 b	57 c
23	101 b	281 a	24 a	0.69 c	6.9 b	60 b	53 d
16	103 a	255 b	18 b	0.79 b	6.9 b	58 b	60 a
30	100 b	270 a	18 b	0.87 b	6.9 b	63 b	57 b
10	100 b	270 a	16 c	0.75 b	6.9 b	59 b	54 b
8	99 c	259 b	24 a	0.74 b	6.7 b	61 b	55 b
14	99 c	262 b	17 b	0.76 b	6.6 b	57 b	56 b
31	104 a	268 a	13 d	0.75 b	6.4 b	58 b	54 b
35	106 a	283 a	19 b	0.67 c	6.4 b	57 b	63 a
17	100 b	270 a	20 a	0.77 b	6.4 b	60 b	63 a
18	102 b	260 b	19 b	0.69 b	6.3 b	59 b	62 a
5	102 b	270 a	23 a	0.70 b	6.2 b	59 b	45 d
45	107 a	270 a	12 d	0.94 a	6.1 b	70 a	36 e
19	101 b	266 b	19 b	0.85 b	6.0 b	59 b	60 a
24	99 c	270 a	21 a	0.77 b	5.7 b	62 b	47 d
40	104 a	269 a	15 c	0.80 b	5.3 b	62 b	47 d
<b>DSH 0.05</b>	<b>3.7</b>	<b>15.9</b>	<b>3.4</b>	<b>0.3</b>	<b>2.8</b>	<b>8.1</b>	<b>8.0</b>
<b>CV (%)</b>	<b>2.7</b>	<b>6.0</b>	<b>38.7</b>	<b>17.3</b>	<b>16.0</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>

FLORF = días a floración femenina; ALTPL = altura de planta; ACAME = acame de planta; MAZPL = mazorcas por planta; REND = rendimiento de grano; PHEC = peso hectolítrico del grano; P100S = peso de cien semillas; DSH = Tukey

Las variedades 7, 25 y 23 de Puebla rindieron 8.3, 8.2 y 7.9 t ha<sup>-1</sup> respectivamente, y son originarias de San Francisco Cuautlancingo, San Antonio Atzitzintla y San Martín Ojo de Agua, respectivamente. En relación al peso hectolítrico del grano, las variedades de maíz Cacahuacintle fluctuaron entre 57 a 64 kg hL<sup>-1</sup>, resultado similar al obtenido por Bonifacio *et al.* (2005), mientras que en el híbrido H-44 fue de 74 kg hL<sup>-1</sup>; por el contrario, en el peso de 100 semillas todas las variedades de Cacahuacintle superaron ( $P \leq 0.05$ ) al ‘H-44’ con valores de 45 a 64 g vs. 33 g del híbrido. Lo anterior se debe a la textura harinosa y tamaño grande del grano de Cacahuacintle, que son atributos de calidad para su consumo como pozole (Cuadro 2).

**Análisis de componentes principales**

De acuerdo con el análisis de componentes principales (CP, datos no mostrados), los dos primeros componentes explicaron 57 % de la variación total de las variables medidas; los vectores propios asociados con la CP1

alcanzaron valores de 0.47 y 0.48 para número de mazorcas por planta y peso hectolítrico respectivamente, en tanto que para la CP2 fueron de 0.68, 0.37 y 0.31 para rendimiento, altura de planta y peso de 100 semillas, respectivamente. Tales valores son proporcionales a los coeficientes de correlación simple entre CP y las variables (Johnson y Wichern, 1999).

En la representación gráfica (Figura 1) del comportamiento de las variedades en función de CP1 y CP2, el híbrido ‘H-44’ se ubica en una posición aislada del resto de variedades de maíz Cacahuacintle; entre los cuadrantes I y II se ubicó un grupo de variedades criollas de Cacahuacintle con la mejor expresión de las variables involucradas en los componentes principales, es decir, las mejores variedades en función del rendimiento, caracteres de planta y grano, y que serían las de mayor potencial para la producción de maíz Cacahuacintle en la región de estudio. Entre éstas sobresalen las variedades 7, 11 y 32 originarias de San Francisco Cuautlancingo, Puebla, Ayapango y Santa María Nativitas, del Estado de México.




Figura 1. Representación gráfica del comportamiento de variedades criollas de maíz Cacahuacintle evaluadas en el Valle de Toluca, Estado de México. Los números representan a las variedades enlistadas en el Cuadro 2. El círculo grande agrupa a las variedades criollas sobresalientes, y el pequeño al híbrido ‘H-44’ (testigo). Tres variedades (9, 14 y 24) están ocultas por otras.

## CONCLUSIÓN

De las variedades criollas de maíz Cacahuacintle evaluadas, provenientes de los Estados de Puebla y México, se identificaron las sobresalientes por alto rendimiento, porte alto de planta, bajo peso hectolítrico y tamaño grande de grano, con cuya explotación se podría elevar la producción de maíz Cacahuacintle para elote y para grano “pozolero” en el Valle de Toluca.

## BIBLIOGRAFÍA

- Albarrán M M, J L Arellano V, R Garza G, R Valdivia B, A Espinosa C, F Alemán R, C Ortíz T, C Díaz H (1990) Guía para Cultivar Maíz en el Estado de México. Folleto para Productores Núm. 1. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuarias. Centro de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del Estado de México. 31 p.
- Bonifacio V E, Y Salinas M, A Ramos R, A Carrillo O (2005) Calidad pozolera en colectas de maíz cacahuacintle. Rev. Fitotec. Mex. 28:253-260.
- CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (2001) International Maize Testing Program: 1999 Final Report. Mexico, D. F. 592 p.
- García E (1973) Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen para Adaptarlo a las Condiciones de la República Mexicana. Instituto de Geografía. UNAM. 246 p.
- González H A, J Sahagún C, D de J Pérez L, A Domínguez L, R Serrato C, V Landeros F, E Dorantes C (2006) Diversidad fenotípica de maíz cacahuacintle en el Valle de Toluca. México. Rev. Fitotec. Mex. 29: 255-261.
- Johnson R A, D W Wichern (1999) Applied Multivariate Statistical Analysis. 4th ed. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ, USA 816 p.
- SAS Institute (1996) SAS/STAT Guide for Personal Computers, version 6.12, SAS Institute. Cary, N. C. 1028 p.